

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

3-2023

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

V.U.Ro'ziboyev, M.M.Kamolova, G.A.Toshqo'ziyeva

Atmosfera qatlamlarida diffuz o'tgan va qaytgan quyosh nurlanishining spektral va burchakli taqsimlanishi 7

KIMYO

S.I.Tirkasheva, O.E.Ziyadullayev, V.G.Nenaydenko, F.Z.Qo'shboqov

Turli xil tabiatga ega ketonlarni enantioselektiv etinillash asosida atsetilen spirtlari sintezi 12

A.A.Ibragimov, T.Sh.Amirova, M.Sh.Axmedova

Geranium collinum o'simligini makro va mikroelementlarni tarkibi va miqdorini aniqlash 19

I.R.Askarov, G.A.Mominova

Do'lana tarkibidagi flavonoidlar miqdorini aniqlash 24

S.M.Egamov, A.A.Ibragimov, D.G'.O'rmonov

Ilmoqtumshuq uchma (*Ceratocephala falcata*) o'simligi yer ustki qismining aminokislota va vitamin tarkibini o'rganish 30

Z.M.Chalaboyeva, S.R.Razzoqova, B.S.Torambetov, Sh.A.Kadirova

Co (II), Ni (II) va Cu (II) tuzlari bilan 3-amino-1,2,4-triazolning kompleks birikmalarini sintezi va tadqiqoti 34

M.Y.Ismoilov, N.F.Abduqodirova

Urtica dioica (Qichitqi o't) o'simligini kimyoviy tarkibini tadqiq qilish 41

N.O.Maxkamova, A.X.Xaitbayev

Xitozan va u asosida olingan pylonka materiallarining optik spektroskopik xossalari 47

B.B.Raximov, B.Z.Adizov, M.Y.Ismoilov

Muqobil yo'l bitumni olish va uni sifatini baholash 53

Z.Q.Axmedova, M.Y.Imomova, M.R.Mamataliyev

Inula helenium L o'simligining element tarkibi va tibbiyotda qo'llanilishi 58

Kh.N.Saminov, A.A.Ibragimov, O.M.Nazarov

O'zbekistonda o'sadigan *Punica granatum L.* O'simligi "Qayum" navi barglari va gullarining uchuvchan komponentlarini o'rganish 61

O.T.Karimov, F.N.Nurqulov, A.T.Djalilov

Organik kislota tuzlari bilan modifikatsiyalangan polietilenni termik xususiyatlarini tadqiq etish 68

Sh.Sh.Turg'unboyev, H.S.Toshov, S.B.Raximov

Gossipol 2-amino 4-metilpiridin bilan Co³⁺ kationini analitik aniqlash 71

M.A.Axmadaliev, N.M.Yakubova, B.M.Davronov, B.M.Marufjonov

Furfurol olishda katalisatorlarning roli 76

S.T.Islomova, I.R.Asqarov

Ko'ka (*Tussilago farfara*), karafs (*Apium graveolens*), kartoshka (*Solanum tuberosum*) o'simliklari tarkibidagi makro va mikro elementlar taxlili 80

O.T.Karimov, N.Innat, F.N.Nurkulov, A.T.Djalilov

Kobalt asetat bilan modifikatsiyalangan polietilenning termik barqarorligini tadqiq qilish 86

BIOLOGIYA

M.U.Mahmudov, I.I.Zokirov

G'arbiy Farg'ona qandalalari (Heteroptera: Pentatomidae, Miridae) faunasiga doir yangi ma'lumotlar 90

B.M.Sheraliyev, Sh.A.Xalimov

Farg'ona viloyati Qo'shstepta tumani zovurlari baliqlarining uzunlik va og'irlilik munosabatlari 93

A.Ma'rupo

O'zbekiston Uzunmo'ylov qo'ng'izlari (Coleoptera, Cerambycidae) ning taksonomik tahlili 99

GOSSIPOL 2-AMINO 4-METILPIRIDIN BILAN Co^{3+} KATIONINI ANALITIK ANIQLASH**АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНА Co^{3+} С ГОССИПОЛ-2-АМИНО-4-МЕТИЛПИРИДИНОМ****ANALYTICAL DETERMINATION OF Co^{3+} CATION WITH GOSSIPOL-2-AMINO-4-METHYLPYRIDINE**

**Turg'unboyev Shavkatjon Shuhratjon o'g'li¹, Toshov Hamza Sayidmurodovich²,
Raximov Samariddin Baxodirovich³**

¹**Turg'unboyev Shavkatjon Shuhratjon o'g'li**

– Farg'ona davlat universiteti Ekologiya kafedrasи mudiri, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

²**Toshov Hamza Sayidmurodovich**

– O'zbekiston milliy universiteti, Organik sintez va amaliy kimyo kafedrasи katta o'qituvchisi, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

³**Raximov Samariddin Baxodirovich**

– O'zbekiston milliy universiteti, Analitik kimyo kafedrasи katta o'qituvchisi, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya

Mazkur maqolada mahalliy xom-ashyo hisoblangan g'o'za o'simligidan ajratib olinadigan gossipol moddasi asosida olingan Schiff asosi (di(2-amino, 4-metil piridin)) ning Co^{3+} ionini analitik aniqlashning turli shart-sharoitlari keltirilgan.

Аннотация

В данной статье представлены различные условия аналитического определения Иона Co^{3+} основания Шиффа (ди(2-амино, 4-метилпиридин)), полученного на основе вещества госсипола, выделяемого из хлопчатника, который считается местным сырьем.

Abstract

This article presents various conditions for the analytical determination of the Co^{3+} ion of the Schiff base (di(2-amino, 4-methylpyridine)) obtained on the basis of the substance gossipol isolated from cotton, which is considered a local raw material.

Kalit so'zlar: gossipol, Schiff asoslari, kompleks birikma, gossipol 2-amino 4-metilpiridin, optimal sharoit, optik zichlik.

Ключевые слова: госсипол, основания Шиффа, комплексное соединение, госсипол 2-амино 4-метилпиридин, оптимальные условия, оптическая плотность.

Key words: gossipol, Schiff bases, complex compound, gossipol 2-amino 4-methylpyridine, optimal conditions, optical density.

KIRISH

Turli metall ionlari bilan kompleks hosil qilishda organik reagentlar analitik faol guruhlarining ishtirok etish mexanizmini aniqlash, kompleks hosil bo'lishida funksional faol guruhlarni tanlash va yangi uslublarni yaratish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda analitik kimyogarlar tomonidan turli xil og'ir zaharli metall ionlarini kompleks hosil qiluvchi Schiff asoslari yordamida aniqlash uslublarini ishlab chiqish va ularni rivojlantirish borasida keng qamrovli izlanishlar olib borilmoqda. Atrof-muhitning turli obyektlaridan metall ionlarini aniqlashda Schiff asoslari yordamida tanlab ta'sir etuvchan, tezkor, yuqori sezgirlikka ega bo'lgan zamonaviy usullarni ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Gossipol asosida olingan Schiff asoslari ayrim metallar bilan maxsus sharoitlarda o'ziga xos rangli birikmalar hosil qiladi. Gossipol birikmalarining ushbu xossalariiga asoslanib ularni analitik kimyoda metall ionlarini aniqlashda reagent sifatida ishlatalishi mumkin. Turli metall ionlari gossipol birikmalarining suv-asetonli yoki suv-spiritli eritmalarida gossipolatlar deb nomlanadigan metallarning tuzlarini hosil qiladi. Odadta metall gossipolatlari suvdan qiyin eriydigan birikmalar bo'ladi. Ammo gossipolatlar bir qancha organik erituvchilarda: benzol, xloroform, uglerod

tetraxlorid, spirtlarda ma'lum miqdorda eriydi. Og'ir metallarning gossipolatlarini olish va xossalarni o'rganish hozirgi kungacha yetarlicha tadqiq qilinmagan, ko'plab gossipolatlarning strukturaviy tuzilishi ham o'rganilmagan. Faqatgina bir valentli kumush kationining gossipolati haqida ko'plab ma'lumotlar bor [1].


MATERIAL VA METODLAR

Dastlab Co^{3+} ioninining gossipol 2-amino 4-metil piridin reagenti bilan kompleks hosil qilish spektrofotometrik reaksiyasini o'rganish uchun reaksiyaning optimal sharoitlari tanlandi.

50 ml li o'lchov kolbasiga 0,015 mol/l li kobalt (III) tuzi eritmasidan 1,0 ml, 0,015 mol/l li gossipol 2-amino 4-metil piridin reagenti eritmasidan hamda turli bufer eritmalaridan har xil pH muhit hosil qilgan holda 5 ml solinib, idish belgisigacha atseton bilan to'ldirildi va solishtirma eritmaga nisbatan ($\lambda_{\text{max}}=380$, $l=1$ sm) o'lchandi. Tadqiqot natijalari 1-jadvalda keltirilib, 1-rasmda natijalarning o'zgarib borishi grafik shaklida ifodalangan.

1-jadval

Optik zichlikni pH ga bog'liqligi								
pH	1,82	3,03	4,10	5,07	6,02	7,0	7,93	8,97
\bar{A}	0,08	0,342	0,524	0,438	0,325	0,183	0,125	0



1-rasm. Optik zichlikni muhitga bog'liqlik grafigi

Olingan natijalardan ko'rinish turibdiki, kuchli kislotali muhit kamayishi bilan optik zichlik ortib bordi. Eritmaning pH qiymati 4,2 ga yetganda optik zichlik eng yuqori qiymatga ega bo'ldi. Keyingi ishlar pH=4,2 bo'lgan bufer eritmalaridan foydalanildi.

Optimal bufer tanlash

50 ml o'lchov kolbasiga 0,015 mol/l li Co^{3+} eritmasidan 1,0 ml, 0,015 mol/l li gossipol 2-amino 4-metil piridin reagenti atsetondagi eritmasidan 1,0 ml, 5,0 ml dan pH= 4,2 bo'lgan bufer eritmalaridan alohida solib, idish belgisigacha aseton bilan to'ldirildi. Hosil qilingan har xil eritmaning optik zichligi ($\lambda_{\text{max}}=380$ nm, $l=1$ sm) solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Optimal bufer eritma tanlash

Bufer eritma	Bufer eritmaning tarkibi	pH	$\bar{A}_{\text{o't}}$
Universal	$(\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaOH})$	4,23	0,525
Na-fosfatli	$(\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{HPO}_4)$	4,23	0,220
Na-sitratli	$(\text{HCl} + \text{NaH}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_6)$	4,23	0,385

Olingan natijalarga ko'rinishdiki eng katta optik zichlikka pH=4,2 bo'lgan universal bufer eritmada erishildi. Keyingi tatqiqotlarni olib borishda pH=4,2 bo'lgan universal buferdan foydalindি.

KIMYO

Optik zichlikni komponentlarning quyilish tartibiga bog'liqligi

Komponentlarning quyilish tartibini aniqlashda turli quyilish tartibalarida kompleks birikma hosil qilindi. Bunda, 50 ml o'lchov kolbasiga 0,015 mol/l li Co^{3+} eritmasidan 1,0 ml, 0,015 mol/l li gossipol 2-amino 4-metil piridin reagenti asetondagi eritmasidan 1,0 ml, 5,0 ml dan pH= 4,2 bo'lgan bufer eritmalaridan alohida solib, idish belgisigacha aseton bilan to'ldirildi. Hosil qilingan har bir eritmaning optik zichliklari ($\lambda_{\text{max}}=380 \text{ nm}$, $I=1,0 \text{ sm}$) solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi.

Ko'zlangan maqsadga erishish uchun reagentlarning quyilish tartiblari 6 xil bo'lgan holda eritmalar tayorlandi. O'lhash natijalari 3-jadvalda keltirildi.

3-jadval**Komponentlarning quyilish tartibini aniqlash**

Nº	Quyilish tartibi	\bar{A}
1	$\text{Co}^{3+} + \text{bufer} + R$	0,5300
2	$\text{Co}^{3+} + R + \text{bufer}$	0,450
3	$\text{bufer} + R + \text{Co}^{3+}$	0,390
4	$\text{bufer} + \text{Co}^{3+} + R$	0,450
5	$R + \text{bufer} + \text{Co}^{3+}$	0,410
6	$R + \text{Co}^{3+} + \text{bufer}$	0,400

Olingan natijalarga ko'ra 1-quyilish tartibida yani $\text{Co}^{3+} + \text{bufer} + R$ ketma-ketligida kompleks maksimal optik zichlikka ega bo'ldi. Keyingi tekshirishlarda esa aynan 1-quyilish tartibidan foydalanilgan holda tadqiqotlar o'tkazildi.


Kompleksning barqarorligini vaqtga bog'liqligi.

50 ml o'lchov kolbasiga 0,015 mol/l li Co^{3+} eritmasidan 1,0 ml, 0,015 mol/l li gossipol 2-amino 4-metil piridin reagenti asetondagi eritmasidan 1,0 ml, 5,0 ml dan pH= 4,2 bo'lgan bufer eritmalaridan alohida solib, idish belgisigacha aseton bilan to'ldirildi. Hosil bo'lgan kompleks birikmaning optik zichligi $\lambda_{\text{max}}=380 \text{ nm}$, $\alpha=1,0 \text{ sm}$ da ma'lum vaqt oraliq'ida solishtirma eritmaga nisbatan aniqlandi.

Tadqiqot natijalari 4-jadvalda keltirilib, 3-rasmida natijalarning o'zgarib borishi grafik shaklida ifodalangan.

4-jadval**Optik zichlikning vaqtga bog'liqligi**

t_{min}	0,1	1	5	10	20	30	40	50	60
\bar{A}	0,11	0,53	0,541	0,543	0,532	0,538	0,54	0,544	0,539

**3-rasm. Kompleks birikma hosil bo'lishida optik zichlikning vaqtga bog'liq ravishda o'zgarish grafigi**


O'tkazilgan tadqiqot natijalaridan xulosa qilish mumkinki, komponentlar to'liq reaksiyaga kirishib kompleks hosil bo'lishi uchun 1 minut vaqt yetarli bo'lar ekan.

Kompleks birikma optik zichligining quylgan reagent miqdoriga bog'liqligi

50 ml o'lchov kolbasiga 0,015 mol/l li Co^{3+} eritmasidan 1,0 ml, 0,015mol/l li gossipol 2-amino 4-metil piridin reagentidan 0,5 ml dan 3,0 ml gacha va universaldan bufer eritmada (pH = 4,2) 5,0 ml olib kolbaning belgisigacha aseton bilan suyultirildi. Hosil bo'lgan kompleks birikmalarning optik zichligi solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi. Tadqiqot natijalari 5-jadvalda keltirilib, 4-rasmda natijalarining o'zgarib borishi grafik shaklida ifodalangan.

5-jadval**Optik zichlikning reagent miqdoriga bog'liqligi** $(\lambda_{\max}=380 \text{ nm}, I=1,0 \text{ sm}, t=1)$

V_{Rml}	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
\bar{A}	0,170	0,289	0,412	0,483	0,538	0,546	0,545	0,542	0,544	0,543



4-rasm. Kompleks birikma hosil bo'lishining quylgan reagent miqdoriga bog'liqligi grafigi

O'tkazilgan tadqiqot natijalaridan shuni kuzatish mumkinki aralashma tarkibida reagent miqdori ortishi bilan optik zichlih ham ortib bordi. Tarkibida 0,015mol/l Co^{3+} tutgan 1,0 ml eritma va 0,015mol/l reagent tutgan 3,0 ml eritma bilan o'zaro reaksiyasida natijasida optik zichlik eng yuqori qiyomatga ega bo'ldi. Reagent miqdori 2,50 ml dan oshganda optik zichlikning pasayishi kuzatildi.

Kompleks birikma optik zichligining element miqdoriga bog'liqligi (Ber qonuniga bo'y sunishi)


Yuqoridagi tajriba orqali aniqlangan optimal sharoitlarga amal qilgan holda, 50 ml li o'lchov kolbalariga har xil miqdordagi (2.0 mkg/ml dan 110 mkg/ml) Co^{3+} eritmalaridan 1,0 ml gossipol 2-amino 4-metil piridin eritmasidan 2,0 ml va bufer eritma (pH=4,2 universal) dan 5,0 ml olib kolbaning belgisigacha dissstillahgan suv bilan suyultiriladi. Hosil qilingan kompleks birikmaning optik zichligi solishtirma eritma nisbatan o'lchandi. Olingan natijalar 3.6-jadval va 10-rasmda keltirildi.

3.6-jadval**Optik zichlikning Co^{3+} miqdoriga bog'liqligi
(pH=4,2; $\lambda_{\max}=440 \text{ nm}$; I=1,0 sm; t=1)**

Nº	$\text{Co}^{3+} \text{ mkg Co}^{3+}/\text{ml}$	$\text{Co}^{3+} \text{ mkg}$	\bar{A}
1	0,1	1,0	0,09
2	0,5	5,0	0,15
3	1,0	10	0,31
4	2,0	20	0,45
5	3,0	30	0,602
6	4,0	40	0,667
7	5,0	50	0,805
8	6,0	60	0,965
9	7,0	70	1,06
10	8,0	80	1,17
11	9,0	90	1,33

KIMYO

12	10	100	1,341
13	11	110	1,345
14	12	120	1,350



5-rasm. Optik zichlikning Co^{3+} miqdoriga bog'liqlik grafigi.

Olingen natijalardan ko'rinib turibdiki, Buger-Lambert-Ber qonuniga bo'ysunish Co^{3+} ning 8 mkg dan 55 mkg konsentratsiyalari oralig'ida kuzatiladi. Undan yuqori konsentrasiyalarda to'g'ri chiziqli bog'lanishdan chetlanish ro'y berdi.

XULOSA

Gossipolning 2-amino 4-metilpiridin bilan olingen Schiff asosi turli xil obyektlar tarkibidan Co^{3+} kationini analitik aniqlash

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Laura Trzonkowska, Barbara Le'sniewska. Beata Godlewska-Zylkiewicz. Development of Solid Phase Extraction Method Based on Ion Imprinted Polymer for Determination of Cr(III) // Ions by ETAAS in Waters. Water. -2022. №14. -P.529.
2. Khaitbaev, A. K., Khakberdiev, S. M., & Toshov, K. S. (2021). Isolation of Gossypol from the bark of cotton roots. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1069-1073.
3. Хайтбаев, А.Х., Тошов, Х.С., & Хушвақов, Ж.Т. (2017). Квантово-химическое исследование некоторых Шифф-оснований. *Начнýй журнал «Austria-science*, 6, 48-51.
4. Абдураимова, З. З., Тошов, Х. С., & Хайтбаев, А. Х. (2021). Госсипол ҳосилаларининг металлокомплекслари тадқиқоти. *Science and Education*, 2(5), 24-27.
5. Тошов, Х. С., Хайтбаев, А. Х., Сарабеков, А. Т., Юлдашев, И. Ш., & Хушвақов, Ж. Т. (2017). КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОЕНИЯ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ ОСНОВАНИЙ ШИФФА ГОССИПОЛА. *Велес*, (6-1), 107-111.