

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

3-2023

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Y.Q.Qayumova, X.M.Komilova	
Turkiston Qum balig'i Gobio lepidolaemus (K.Kessler1872)ning morfometrik xususiyatlarining qiyosiy tahliliga oid	103
U.I.Obidjanov	
Biologiya o'qitish metodikasidan laboratoriya ishlarini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	108
E.X.Najmiddinov, M.A.Muxammadiyev	
Baliqlarning gelmintoz kasalliklariga qarshi antigelmint preparatlarni qo'lash usullari	112
M.M.Mirzaxalilov	
Shahrixonsoyda tarqalgan Kushakevich yalangbalig'ining (Iskandaria kuschakewitschi) ba'zi morfobiologik ko'rsatkichlari	115
N.B.Ikramov	
Shimoliy Farg'onan kanali algoflora taksonlarining mavsumiy dinamikasi	119

GEOGRAFIYA

M.H.Otamirzayeva	
Daryo havzalari landshaftlarini tadqiq etishning zamonaviy metodlari	126
O.I.Abdug'aniev, D.B.Kosimov	
Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimining reprezentativligi va samaradorligini baholash usullari.....	133
M.R. Atabayeva	
O'zbekiston tabiiy geografiyasi kursida "Ichki suvlari va suv boyliklari" mavzusini interfaol o'rganishda klaster usulidan foydalanishning ahamiyati	139
O.I.Abdug'aniev, T.D.Komilova	
Tabiat xilma-xilligi: nazariy asoslari, yondashuvlar va o'rganish usullari	144
P.R.Qurbanov	
O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari rivojlanishining asosiy bosqichlari	150

ILMIY AXBOROT

Q.B.Baratov	
Bo'lajak o'qituvchilarini uzliksiz ma'naviy tarbiya jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	158
A.N.Qosimov	
O'quvchilarda sport vositasida milliy identiklikni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mazmuni	166
J.V.Solijonov	
Bo'lajak pedagoglarda mantiqiy tafakkur rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	172
A.Aloxunov	
Arxeologik tadqiqot usullari xususida	175
I.Aldashev	
O'quv jarayoniga media ta'limning integratsiyasi	182
I.R.Asqarov, G.A.Mo'minova	
Dalachoy tarkibidagi vitaminlar miqdorini aniqlash va ularning organizmga ta'siri	188
F.O.Toshboltayev	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini pedagogik va axborot texnologiyalari integratsiyasi asosida rivojlantirish modeli	194
A.N.Meliboyev	
Inson oliy qadriyat tamoyili asosida jamiyatda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlarining kelgusidagi vazifalari	199
I.A.Suvanov	
Global o'zgarishlar jarayonida AQShning mafkuraviy taraqqiyot yo'li va uning o'ziga xosligi	205
G.R.Mamatdilieva	
Ingliz va o'zbek tillarida "foot/oyoq" kontseptining nominativ maydoni	211
M.O.Habibullaev	
Korruptsiyanı vujudga keltiruvchi ijtimoiy omillari va unga qarshi kurashning mexanizmlari.....	219
F.T.Raximova, S.S.Usmanova	
Minimal matnlarning kognitiv tahlili	222

**TURKISTON QUM BALIG'I GOBIO LEPIDOLAEMUS (K.KESSLER1872)NING
MORFOMETRIK XUSUSIYATLARINING QIYOSIY TAHLILIGA OID**

**К СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТУРЕЦКОЙ ПЕСОЧНОЙ РЫБЫ GOBIO LEPIDOLAEMUS (K.KESSLER, 1872)**

**ON THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS
OF THE TURKISH SAND FISH GOBIO LEPIDOLAEMUS (K.KESSLER1872)**

Qayumova Yorqinoy Qobiljonovna¹, Komilova Xolidaxon Mahamadajonovna²

¹Qayumova Yorqinoy Qobiljonovna

– Farg'ona davlat universiteti katta o'qtuvchisi PhD

²Komilova Xolidaxon Mahamadajonovna

– Farg'ona davlat universiteti o'qtuvchisi

Annotatsiya

Turkiston qum balig'i Gobio lepidolaemus (K.Kessler1872) Sirdaryo havzasining endemik turi bo'lib, asosan tekislik suv havzalarida uchraydi. Ushbu maqlada Turkiston qum balig'ining morfometrik ko'satkichlari haqida so'z yuritildi. Turkiston qum balig'ining tarqalishi, bioekologik xususiyatlariiga adabiyotlarda oid ma'lumotlar qisqacha keltirilgan bo'lib, uning morfometrik ko'satkichlari o'rganilmagan.

Аннотация

Туркестанский пескарь *Gobio lepidolaemus* (K. Kesler, 1872) является эндемиком бассейна Сырдарьи и встречается преимущественно в равнинных водоемах. В данной статье рассказывается о морфометрических показателях Туркестанского пескаря. В данной статье рассказывается о морфометрических показателях Туркестанского пескаря. Сведения о распространении и биоэкологических характеристиках туркестанского морского окуня в литературе представлены кратко, но его морфометрические параметры не изучены.

Abstract

*Turkestan sandfish *Gobio lepidolaemus* (K. Kesler 1872) is an endemic species of the Syrdarya basin and is found in the water bodies of the main plain. This article talks about the morphometric indicators of Turkestan sandfish. This article talks about the morphometric indicators of Turkestan sandfish. Information on the distribution and bioecological characteristics of Turkestan sandfish in the literature is briefly presented, but its morphometric indicators have not been studied.*

Kalit so'zlar: endemik tur, populyatsiya, Farg'ona vodiysi, Turkiston qum balig'i, Sirdaryo.

Ключевые слова: эндемичные виды, популяция, Ферганская долина, Туркестанский пескарь, Сырдарья.

Key words: endemic species, population, Fergana Valley, Turkestan sandfish, Syrdarya.

KIRISH

Qum baliqlar Cypriniformes turkumi, **Gobionidae** oilasi, *Gobio* (Cuvier 1816) urug'iga mansub bo'lib, Gobionidae Yevrosiyoda, asosan Sharqiy Osiyoda uchrab, ushbu oilaga 213 turlar kiradi[1]. *Gobio* urug'iga asosan 46 ta valid turlar kiradi. O'zbekiston suv havzalarida qumbaliqlarning **Gobionidae** oilasiga 3ta urug'ga mansub 5ta turi uchraydi. Bularga *Abbottina* urug'iga – 1ta tur, *Gobio* urug'iga – 3 ta tur, *Pseudorasbora* urug'iga – 1 ta tur kiradi. Ushbu turlar ichida *Gobio* urug'iga mansub turlar biz uchun mahaliy turlar hisoblanadi, *Gobio* urug'iga mansub turlar O'zbekiston ichki suv havzalarida *Gobio lepidolaemus* (K.Kessler1872), *Gobio nigrescens* (Keyserling 1861) va *Gobio sibiricus* (Nikolski 1936) baliq turlari uchrashi qayd qilingan [2]. Farg'ona vodiysi qumbaliqlari asosan tekislik suv havzalarida uchraydi, ular toza suvlarni afzal ko'radi, lekin, judayam sovuq suvlarni xohlamaydilar [3]. Ushbu tur Orol dengizi havzasi balig'i hisoblanadi. Uning O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Eron chuchuk suv havzalarida uchrashi qayd qilingan[13]. Qirg'izistonda Chuy vodiysi suv havzalarida, Norin, Talas, Qoradaryo, Oq-Bura daryolarida uchraydi. O'zbekistonning Farg'ona vodiysi qismida ham keng tarqalgan turlar qatoriga kiradi. Kichik baliq bo'lib, ov ahamiyatiga ega emas. Daryo o'zanlarida, chuchuk suvlarda, buloqlarda, kanallarda va sholizorlarda yashaydi, ko'pincha yirik to'dalarni hosil qiladi. Odatta tog' etaklaridan yuqoriga chiqmaydi[4]. Ular asosan suvlarning ostki qismidagi oqimlarida harakatlanadi. Odatta baliqlar butun bahor va yoz oylarida suv havzalarining kemirchakli yoki qumli tubida uchrab, yoz oxirlari va kuz oylarida, ular balchiqli va qumli tublariga chuqurroq kirib boradilar, qum baliqlar nomi ham shundan kelib chiqqan. Lekin, ular kunduz kunlari suv o'tlariga boy bo'lgan joylarida umuman uchramaydi[5],[6]. Bizning kuzatuvlarimiz ham baliqlarning asosan

suv havzalarining tub qismlarida yashashi kuzatildi. Turkiston qum balig'ining adabiyotlarda tarqalishi, bioekologik xususiyatlarga oid ma'lumotlar qisqacha keltirilgan bo'lib, uning morfometrik ko'rsatkichlari o'rganilmagan. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Farg'ona vodiysining ichki suv havzalarida tarqalgan *Gobio lepidolaemus*ning morfometrik ko'rsatkichlari va bioekologik xususiyatlarini tadqiq etishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqotning material va uslubiyoti. Kuzatishlarimiz 2022-yil qish va 2023-yil bahor mavsumi davomida olib borildi. Farg'ona viloyatining Quva tumanidagi zovurlar, Farg'ona shahridagi Marg'ilon soy, Katta farg'ona kanali suv havzalaridan namunalar olindi. Namunalarni ovlashda kichik baliqlarni tutishga moslashtirilgan to'rlar va qarmoqlardan foydalanildi. BAliqlarni tutishda va fiksatsiya qilishda Freyhov va Kottelat (2007) metodikasi asosida o'lchandi[14]. Plastik belgilarni variatsion statistik tahlil qilishda o'rta arifmetik qiymat xatosi, o'rta kvadrat og'ish, variatsiya koeffitsiyentlari metodlaridan foydalanildi [15]. Tutilgan baliq namunalari anestiziya qilinganidan so'ng 5-10 foizli formalin eritmasida fiksatsiya qilindi. Materiallarni statistik tahlil qilishda "Exsel" programmasidan foydalanildi. Namunalarni o'lchashda 0,01 mm aniqlikda raqamli shtangensirkul hamda 0,1 g aniqlikdagi elektron tarozidan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Turkiston qum balig'i Farg'ona vodiysining katta va kichik suv havzalarida uchrovchi kichik baliq turi bo'lib, uning morfologik belgilari adabiyotlar va bizning kuzatuvlarimizda, tanasi urchuqsimon cho'ziq, anchagina yirik tangachalar bilan qoplanganligi. Og'zi pastki yoki uchki, bo'lishi, pastki labi yupqa, o'tasidan ajralgan.



1-rasm. *Gobio lepidolaemus* Kessler 1872.

Ustki labi ham yupqa bo'lib, lekin butun.Og'zining burchaklarida bittadan mo'ylovi bor. Ko'zlari bir oz cho'ziq. Jag' tishlari ilmoqli bo'lib cho'zilib o'sgan. Yon tomonlari sarg'ish qorin qismi oqish rangda. Ayrimlarining ikki yonida bir qatordan bilinar-bilinmas xollari bor. Suzgichlari sarg'ish rangda mayda qora dog'lari bo'ladi. Tana uzunligi 4-4,5 sm, vazni 2-3 g gacha bo'lgan tananing yon tomonlarida 7 dan 12 gacha qora dog'lar mavjud va yosh baliqlarda dog'lar soni kattalarnikiga qaraganda ko'proq

BIOLOGIYA

Dorsal fin III 7, anal II 6 nurlar, lateral chiziqda 37 dan 42 tagacha tangachalari bo'ladi. Tananing yon tomonlarida 7 dan 12 gacha qora dog'lar mavjud va yosh baliqlarda dog'lar soni kattalarnikiga qaraganda ko'proq. Bir yoshda jinsiy yetuk bo'lib, tuxumlari bo'laklarga bo'lingan, shuning uchun urug'lanish davri aprel oyining oxiridan avgustgacha davom etadi. Urg'ochilarning unumtdorligi, ularning kattaligiga qarab, 500 dan 2000 tagacha tuxum qo'yadi. Tuxumlar havza tubiga yoki o'simliklar va toshlarga yopishib qoladi. Har xil suv o'tlar va mayda jonivorlar bilan ovqatlanishi tufayli ovlanadigan baliqlarning yemishiga sherik bo'lib zarar yetkazadi [9].

Farg'ona vodiysidagi kichik suv havzalari zovurlardan tutilgan *Gobio lepidolaemus* (n=13) va yirik suv havzasi Qoradaryodan tutilgan *Gobio lepidolaemus* (n=10) ning plastik ko'rsatkichlari o'rganildi va tahlil etildi.

Farg'ona viloyati suv havzalaridan tutilgan Turkiston qum balig'i *Gobio lepidolaemus*. (K.Kesller1872)ning morfometrik xususiyatlari

	Zovurlar (n=10)					Qoradaryo (n=13)				
	Min	Max	M±m	SD	V	Min	Max	M±m	SD	V
L	81,17	100,42	85,84±1,90	5,71	81,17	81,17	115,5	100,93±2,84	10,23	10,14
L	64,19	81,52	73,52±1,69	5,06	6,88	64,19	97,39	81,83±2,68	9,67	11,82
Standard uzunlikning % i hisobida										
HL	19,66	24,67	24,01±0,85	23,49	21,64	23,27	28,78	25,99±0,45	1,64	6,3
BDM	19,66	18,07	1,25±0,71	20,31	20,00	21,02	24,96	21,94±0,53	1,9	8,67
BWM	11,92	14,15	3,88±0,49	13,99	21,02	11,15	21,74	15,57±0,78	2,8	17,98
PRD	40,81	46,40	48,00±1,37	43,62	51,54	14,34	51,54	45,81±2,70	9,74	21,26
PSD	33,90	40,14	45,38±1,54	33,14	41,28	33,14	49,09	40,35±1,17	4,23	10,49
PRP	40,08	45,65	47,02±1,77	39,29	41,11	40,79	54,36	48,97±1,08	3,89	7,94
PRA	48,88	58,35	59,42±2,27	46,88	53,10	50,28	75,9	67,52±1,74	6,27	9,29
DFL	16,93	21,92	19,14±1,49	11,09	23,92	15,16	58,81	23,51±3,02	10,89	46,3
DFBL	10,58	14,00	12,47±0,50	10,67	13,27	12,52	20,5	14,75±0,73	2,62	17,75
PFL	14,12	15,95	16,23±1,16	7,62	13,48	12,73	17,6	15,38±0,35	1,28	8,3
PPD	11,86	26,10	17,543±1,37	4,12	23,49	16,02	22,17	19,74±0,46	1,68	8,49
AFL	12,92	19,67	15,71±0,79	2,38	13,48	13,2	17,79	19,74±0,46	1,61	10,32
AFBL	5,89	17,49	9,97±1,14	3,41	34,22	6,85	17,69	10,11±0,77	2,76	27,33
CFL	10,55	21,85	15,38±1,13	3,39	22,02	12,52	26,7	20,76±0,98	3,52	16,96
CPL	11,33	23,85	16,92±1,19	3,56	21,05	16,73	24,92	20,93±0,58	2,1	10,06
CPD	7,82	17,26	11,90±1,11	3,33	28,00	9,73	20,03	11,87±0,78	2,83	23,84

Aniq va tabiiy fanlar

	BIOLOGIYA									
CPW	6,20	15,48	10,15±0,99	2,97	29,23	5,24	12,08	8,30±0,85	3,07	37,04
PPD	11,86	26,10	17,54±1,37	4,12	23,49	20,6	27,45	23,85±1,17	4,21	17,65
PAD	11,72	25,30	17,95±1,40	4,20	23,37	18,22	25,3	20,55±0,99	3,59	17,45
VAD	3,22	9,99	6,56±0,65	1,95	29,69	5,04	9,38	6,87±0,44	1,59	23,14
PPD Bosh uzunligining % i hisobida										
HDN	39,99	81,47	59,85±3,97	11,91	19,90	36,51	81,62	69,20±3,97	10,90	15,75
HDE	32,36	72,21	50,27±4,34	13,03	25,92	38,65	68,93	53,73±2,22	8,00	14,89
HW	33,69	77,80	56,26±5,18	15,53	27,60	51,01	75,61	64,29±1,60	5,78	8,99
SNL	20,82	46,68	31,90±2,50	7,49	23,47	36,60	77,80	42,58±3,09	11,14	26,17
ED	13,86	31,42	20,25±1,66	4,99	24,62	15,46	38,95	21,48±1,59	5,75	26,76
IOW	16,11	51,37	33,14±3,47	10,40	31,39	20,54	46,51	37,78±1,72	6,21	16,45
POL	16,11	51,37	33,14±3,47	10,40	31,39	36,62	54,97	44,31±1,15	4,16	9,38
MBL	23,36	40,47	27,82±1,79	5,36	19,26	49,69	33,14	6,94±1,93	20,95	25,51

Izoh: min – minimal uzunlik; max – maksimal uzunlik; $M \pm m$ – o'rtacha uzunlik va o'rta arifmetik qiymat xatosi; δ – o'rta kvadrat og'ish; V – variatsiya koffitsiyenti;

BIOLOGIYA

Tadqiqotda foydalanilgan Farg'ona suv havzalarida uchrovchi Gobio lepidolaemusning umumiyligi tana uzunligi $81,17\text{--}115,49$ mm, o'rtacha $100,93\pm2,84$ mm ni, standart uzunligi esa $64,19\text{--}97,39$ mm, o'rtacha $81,83\pm2,68$ mm ni tashkil qildi. Ushbu maqolada Qoradaryo suv havzalarida tarqalgan Gobio lepidolaemus ning morfometrik ko'rsatkichlari ham keltirib o'tilgan[2]. Gobio lepidolaemus baliqlari asosan vodiy daryolaring o'ita va quiyi oqimlarida uchrab, daryoning yuqori oqimida uchrashi tadqiqot davomida qayd etilmadi. Ular yirik daryo o'zanlaridan tashqari kichik sun'iy suv havzalari zovurlarda, ariqlar, sholipoyalarida ham to'da hosil qilib yashashi kuzatildi. Turkiston qum baliqlari 30 ta morfometrik belgisiga ko'ra o'rganilib tahlil etildi. Shu bilan birga qum baliqlarning plastik belgilaringin o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti (V) ham tahlil etildi.

Farg'ona vodiysi zovurlarida uchrovchi qum baliqlar populyatsiyasida 15 ta tana plastik belgilari bo'yicha yuqori $V>10\%$, boshdagisi 8 ta belgisidan 2 tasida yuqori $V>10\%$, 6 ta belgisiga ko'ra o'rtacha $V<10\%$ va 7 belgisi bo'yicha esa $V<5\%$, past darajadagi o'zgaruvchanlikka uchraganliklari qayd etildi. Qoradaryo qum baliqlari populyatsiyasida o'zgaruvchanlik Farg'ona zovurlarda uchrovchi qum baliqlarning variabelligiga nisbatan pastroq bo'lib, 9 belgisida 10% dan yuqori darajadagi o'zgaruvchanlik mavjudligi, 3 belgisi bo'yicha o'rtacha darajadagi o'zgaruvchanlikka va 16 belgisi bo'yicha esa past darajadagi o'zgaruvchanlikka uchragani aniqlanildi. Bu ko'rsatkichlar qum baliqlarning asosiy belgilari hisoblanib, o'zgaruvchanlikni aniqlashda katta ahamiyatga ega.

Dastlab, ***Gobio fluviatilis lepidolaemus***, nomi K.Kessler(1872) tomonidan qayd etilgan bo'lib, O'zbekistonning Zarafshon daryosidan, Sirdaryoning Tojikistonga qarashli Xo'jand shahridagi qismidan topilgan. L.S Berg ushbu turni morfologik belgilari asosida Gobio gobio (Linnaeus 1758) balig'inining sinonimi deb tavsiflaydi[7]. Keyinchalik, Mitrofanov, Reshetnikov va Nasekalar ham ushbu baliqni Gobio gobio (Linnaeus 1758)ning sinonimi deb ko'rsatib o'tadilar [8],[12]. Kottelat va Banaresularning genetik tahlillariga ko'ra hozirda baliq Gobio lepidolaemus Kessler 1872 sifatida amal qiladi[10].

XULOSA

Gobio lepidolaemus Kessler 1872 hozirda Farg'ona vodiysining katta va kichik suv havzalarida to'dalar hosil qilib uchrovchi baliqlari bo'lib, ushbu baliq vodiy sharoitida populyatsiyalar arealining kengayyotgan turlar qatoriga kiradi. Maqolada vodiy sharoitida uchrovchi Gobio lepidolaemusning morfometrik ko'rsatkichlari ilk bor tahlil etildi. Turlarni o'zaro morfometrik farqlarini tadqiq etish ularni to'g'ri identifikasiya qilishda, populyatsiyalarni vareabillik holatini baholash uchun muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B.W.Coad Review of the gobionids of Iran (Family Gobionidae) *Canadian Museum of Nature, Ottawa, Ontario, K1P 6P4 Canada*.Email: bcoad@mus-nature.ca 2019 Iranian Society of Ichthyology Accepted: March 7, 2019. P-ISSN: 2383-1561; E-ISSN: 2383-0964 doi: 10.22034/iji.v6i1.325
2. Sheraliev, B., Allayarov, S., Peng, Z. (2020). First records of *Gobio nigrescens* and *Gobiosibiricus* (Cypriniformes: Gobionidae) from the Amu Darya River basin, Uzbekistan. *Journal of Applied Ichthyology*. 36 (2). Pp. 235-239.
3. Б.А.Мовчан. Жизнь рыб и их разведение. 1974стр.222-223 Berg, L. S. (1949). *Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran* [Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries] Vol. 2. (4th ed.). Moscow, eningrad: Academy of Sciences of the USSR Press.
4. Г. У. Линнберг. Личинкоядны рыб средне азии. издательств академий наулк. СССР Москва 1947 ленинград. 22-24.
5. Т.З.Зохидов. Zoollogiya ensiklopediyasi Baliqlar va tuban xordalilar Toshkent. 1979 yil. 222-223.
6. Л.П.Сабанева. « Рыбы России. Жизнь и ловли наших пресноводных рыб».1875год.
7. Berg, L. S. (1949). *Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran* [Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries] Vol. 2. (4th ed.). Moscow, Leningrad: Academy of Sciences of the USSR Press.
8. Mitrofanov, V.P. (1988). Rod Gobio Cuvier, 1817 – peskar' [Genus *Gobio* Cuvier, 1817 – Gudgeon]. In: Mitrofanov, V.P., Dukravets, G.M. et al. (Eds.) *Ryby Kazakhstana* [Fishes of Kazakhstan]. Vol. 3. Cyprinidae (continue). Alma-Ata: Nauka. Pp. 5-23.
9. И.М.Мираудуллаев, А.Р.Кузметов, А.Р. Құрбонов.Ўзбекистон балиқлари хилма-хиллиги (моноография). – Тошкент. 71-72-bet
10. Bănărescu P. M.1962 . Phyletische Beziehungen der Arten und Artbildung bei der Gattung Gobio (Pisces , Cyprinidae) // Véstn . Česko - Slov . Spol . Zool . V. 26. No 1. P. 38–64 . – 1992 . A critical updated checklist of Gobioninae .
11. Н.В.Парин, С.АЕвсиенко. Е.Д.Васильева. Рыбы морей России. Аннотированный каталог / Fishes of Russian Seas ,Зоологический музей МГУ, оформление, издание, 2014.
12. Fricke, R., Eschmeyer, W. N., & Van der Laan, R. (eds) (2019). Eschmeyer's Catalog of Fishes: genera, species, references. [Online]. URL: <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp> (Electronic version accessed Octobar 2023).
13. Kotellat, M.Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes., Berlin : Kottelat, Cornel & Freyhof.
14. Лакин Г.Ф. Биометрия. Учебное пособие для биол. Спец. Вузов, 4-е изд., перераб. И доп.- М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.