

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

4-2023

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

O.T.Tursunov, F.R.Holboev

Qashqadaryo viloyatining aholi zich joylashgan hududlarida tarqalgan *Rodentia* turkumi
vakillarining ekologik holati..... 117

B.M.Sheraliyev, D.E.Urmonova, O.S.Azamov

Cottus spinulosus kessler, 1872 (Teleostei: Cottidae) populyatsiyalari orasidagi genetik
farqlanish..... 120

F.N.Xabibullayev, M.M.Yunusov

Farg'ona vodiysida turli xil genotipdagi asalarilardan to'plangan asalning kimyoviy tarkibi 125

U.I.Obidjanov

Biologiya o'qitish metodikasi kursi «Hayvonlar» bo'limi” infuzoriya-tufelka” mavzusi bo'yicha
laboratoriya ishlarini takomillashtirish 129

GEOGRAFIYA

B.B.Eshquvvatov

O'rta Zarafshon konusimon yoyilma landshaft komplekslari..... 133

Y.Karimov, Q.Yarashev

Sirdaryo viloyatida tuproq sho'rliги sizot suvlari sathi va minerallashuvio'zgarishini o'rganish
usullari 139

R.T.Pirnazarov

To'g'onli ko'llar va ularning genezisi haqida..... 144

ILMIY AXBOROT

M.M.Xolmatova

Talabalarda gigiyenik madaniyatini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari..... 150

R.R.Mamatov

Gerta Myuller asarlarining badiiy xususiyatlari 156

R.U.Abdullazizova

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida olam rangli-lisoniy manzarasini shakllantirishning
samaradorligi 156

R.U.Abdullazizova

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida olam rangli-lisoniy manzarasini shakllantirishning
samaradorligi 159

A.A.Mirzayev

Ibn Arabiyoning tasavvufiy-irfoniy qarashlarida “Vahdat ul-vujud” konsepsiysi tahlili 163

L.K.Karshibayeva, H.E.Egamqulov

Sirdaryo viloyatining demografik vaziyati va uning geografik jihatlari..... 166

A.A.Yo'idoshev

O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar strategiyasi..... 171

S.Kunduzaliyeva

Dars jarayonlarida mediyata'limgan foydalanishning ahamiyati 174

N.R.Eshchanova

Nafs tarbiyasida tasavvuf ilmining ahamiyati 178

M.B.Radjabova

O'zbekistonda turar-joy masalasining tarixiy-huquqiy asoslari va davlat tomonidan tartibga solinish
asoslari 182

S.Isroiljonov, V.A.Karimov

Talabalarni jismoniy salomatlik ahvolini darajasi 186

D.I.Umirzakova

Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarining tolerantlik tafakkurini “Yumshoq ko'nikmalar” asosida rivojlantirish
mazmuni 190

K.N.Murodov

Sport kurashida sportchilarining kuch chidamliligini rivojlantirish va musobaqa faoliyati samaradorligini
oshirish texnologiyasi 196

Q.Sh.Omonov, N.A.Abdullayeva

Oziq-ovqat mahsulotlarini kishi sog'ligiga ta'siri aks etgan maqollarning lingvomadaniy tahlili 203

Sh.N.Nurova

Ibn Sino ta'lomitida inson masalasi va insoniy xislatlari to'g'risida 206

Z.N.Usmonov

Sog'lom bo'lish uchun och qolish 209

**COTTUS SPINULOSUSKESSLER, 1872 (TELEOSTEI: COTTIDAE)
POPULYATSIYALARI ORASIDAGI GENETIK FARQLANISH**

**ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ COTTUS
SPINULOSUSKESSLER, 1872 (TELEOSTEI: COTTIDAE)**

**GENETIC DIFFERENTIATION AMONG POPULATIONS OF COTTUS
SPINULOSUSKESSLER, 1872 (TELEOSTEI: COTTIDAE)**

**Sheraliyev Baxtiyor Maxmutali o'g'li¹, Urmonova Dilafruz Erkinjonovna²,
Azamov Obbosxon Sobitjon o'g'li³**

¹Sheraliyev Baxtiyor Maxmutali o'g'li

– Farg'ona davlat universiteti Zoologiya va umumiy biologiya kafedrasи mudiri, b.f.f.d. (PhD)

²Urmonova Dilafruz Erkinjonovna

– Farg'ona davlat universiteti Zoologiya va umumiy biologiya kafedrasи o'qituvchisi

³Azamov Obbosxon Sobitjon o'g'li

– Farg'ona davlat universiteti Ixtiologiya ixtisosligi 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya

Markaziy Osiyo suv havzalarida *Cottus urug'*ning uch turi (*Cottus jaxartensis*, *Cottus nudus* va *Cottus spinulosus*) qayd etilgan. Farg'ona vodiysida ushbu turlarning faqat bittasi – *Cottus spinulosus* uchraydi. Qoradaryo, Marg'ilonsoy hamda So'x daryolarida ushbu turning uchta populyatsiyasi qayd etildi. Mazkur populyatsiyalar mitochondrial COI barkod geni asosida molekulyar-genetik tahlil etilganda, ular filogenetik shajara daraxtida alohida kladalarda joylashgani ma'lum bo'ldi. Populyatsiyalar orasidagi genetik masofa (K2P) 0,62-0,93% oraliqda bo'ldi.

Аннотация

В водоемах Центральной Азии отмечены три вида рода *Cottus* (*Cottus jaxartensis*, *Cottus nudus* и *Cottus spinulosus*). В Ферганской долине встречается только один из этих видов — *Cottus spinulosus*. Три популяции этого вида отмечены в реках Карадарья, Маргилонсой и Сох. Когда эти популяции были проанализированы на основе митохондриального гена штрих-кода COI, выяснилось, что они расположены в отдельных кладах филогенетического генеалогического дерева. Генетическая дистанция между популяциями (K2P) находилась в пределах 0,62-0,93%.

Abstract

Three species of the genus *Cottus* (*Cottus jaxartensis*, *Cottus nudus* and *Cottus spinulosus*) have been recorded in the water bodies of Central Asia. Only one of these species - *Cottus spinulosus* - is found in the Fergana Valley. Three populations of this species were recorded in the Karadarya, Margilonsoy and Sokh rivers. When these populations were analyzed based on the mitochondrial COI barcode gene, it was revealed that they are located in separate clades in the phylogenetic family tree. Genetic distance between populations (K2P) was in the range of 0.62-0.93%.

Kalit so'zlar: chuchuk suv baliqlari, Farg'ona vodiysi, molekulyar-genetik tahlil, toshbuqa, genetik masofa.

Ключевые слова: пресноводные рыбы, Ферганская долина, молекулярно-генетический анализ, подкаменищик, генетическая дистанция.

Key words: freshwater fishes, Fergana Valley, molecular-genetic analysis, sculpins, genetic distance.

KIRISH

Cottidae Bonaparte, 1831 oilasi olabug'asimonlar turkumining butun Yer yuzi bo'ylab keng diapazonda tarqalgan vakillari bo'lib, ularning bugungi kunda 18 urug'ga mansub 203 turi aniqlangan (Fricke et al., 2023). Ushbu oila vakillarining O'zbekiston suv havzalarida faqatgina *Cottus* Linnaeus, 1758 urug'i vakillari uchraydi. Ushbu urug'ning ayni vaqtida 69 turi mavjud bo'lib

BIOLOGIYA

(Fricke *et al.*, 2023), ularning uch turi Markaziy Osiyo suv havzalaridan qayd etilgan. Bular – *Cottus jaxartensis* Berg, 1916 (Chirchiq daryosi havzasi: Ugom daryosi [Qozog'iston va O'zbekiston]), *Cottus nudus* Sideleva, 2021 (Aris daryosi havzasi: Mashat daryosi [Qozog'iston]) va *Cottus spinulosus* Kessler, 1872 (Sirdaryo havzasining juda ko'plab daryolari [Qozog'izton, Qirg'iziston va O'zbekiston]). Farg'ona vodiysidan kashf etilgan *Cottus nasalis* Berg, 1933 morfologik tahlil natijalariga ko'ra *Cottus jaxartensis* ning sinonimi ekanligi ma'lum bo'lgan (Sideleva, 2021). Boshqa tomondan Qozog'istonning Aris daryosi havzasidan 2021-yilda kashf etilgan *Cottus nudus* Baykal havzasidan qayd qilingan *Cottus kessleri nudus* Dybowski, 1908 sabab homonim hisoblanadi va Xalqaro zoologik nomenklatura kodeksiga ko'ra valid hisoblanmaydi. Shu bois ham ayni vaqtida Markaziy Osiyo suv havzalaridagi Cottus urug'inining valid turlarini ikkita deb qarash mumkin.

V.Sideleva (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar davomida *Cottus jaxartensis* hamda *Cottus spinulosus* ning morfometrik hamda meristik ko'rsatkichlari o'zaro kesishishi (overlap) kuzatilgan. Shu bois ham ularni morfometrik yoki meristik ko'rsatkichlari ko'ra farqlash biroz mushkul. Biroq ularni morfologik jihatdan farqlash mumkin. *Cottus jaxartensis* o'zining eng yaqin urug'doshi *Cottus spinulosus* dan tanasidagi mayda bo'rtiqchalarning (spuckles) faqatgina ko'krak suzgich qanotining ostki qismida bo'lishi (vs. tanasining barcha qismida va boshida), interorbital masofaning torligi, odatda ko'zning gorizontal uzunligidan qisqa bo'lishi (vs. interorbital masofa keng, odatda ko'zning gorizontal uzunligidan katta), qorin suzgich qanoti uzun va anal teshigiga yetishi (vs. qorin suzgich qanoti kalta va anal teshigiga yetmaydi) bilan farqlanadi (Sideleva, 2021).

Cottus spinulosus Farg'ona vodiysining ichki suv havzalarida tarqalgan o'z urug'inining yagona vakili bo'lib, uni Qoradaryo, So'x, Marg'ilonsoy va Naymansoy havzalarida kuzatish mumkin (Sheraliyev va boshq., 2021). Bizning mazkur tur populyatsiyalarini molekulyar-genetik jihatdan o'rganish natijalarimiz quyidagi maqolada o'z aksini topgan.

MATERIAL VA METODIKA


Farg'ona vodiysida Qoradaryoning o'rta va quyi oqimi, So'x daryosi, Marg'ilonsoy havzasi hamda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani huddididan oqib o'tuvchi Ugom daryosidan *Cottus* urug'i namunalari 2017-2022-yillar davomida yig'ilgan. Baliqlarni ovlashda kataklarining "ko'z"i 4x6 mm, uzunligi 2-3 metr bo'lgan kichik to'rdan foydalanilgan. Baliq tutish jarayonida xalqaro normalar, jumladan, "Amerika ixtiologlar va gerpetologlar jamiyatasi" (American Society of Ichthyologists and Herpetologists [ASIH]) tomonidan ishlab chiqilgan "Tadqiqot ishida baliqlardan foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar" (2013) dagi qoidalarga to'la riosa qilingan. Dala sharoitida ovlangan baliqlar dastlab 4% li formalin eritmasida fiksatsiya qilingan. Oradan uch kun o'tgach, doimiy saqlash uchun 70% li etil spirtiga solingan. Baliq namunalarini molekulyar-genetik jihatdan o'rganish uchun namunalarning ayrimlari tutilgan zahoti 96% li etil spirtiga solingan va -20°C li haroratda saqlangan. Tadqiqotning taksonomik bosqichlari Farg'ona davlat universiteti Zoologiya va umumiy biologiya kafedrasи laboratoriyasida amalga oshirilgan. Turni aniqlashda L.Berg (1949) hamda V.Sideleva (2021) tomonidan tuzilgan aniqlagichlardan foydalanilgan.

DNK ekstraksiysi ko'krak suzgich qanotidan erituvchi K-proteinaza qo'llagan holda standart fenol-xloroform uslubida amalga oshirildi. Mitochondrial sitoxrom oksidaza I (COI) genining PZR amplifikatsiyasi uchun Ivanova va boshqalar (2007) tomonidan taklif qilingan (FishF2_t1 5'-TGT AAA ACG ACG GCC AGT CGA CTA ATC ATA AAG ATA TCG GCA C-3' va FishR2_t1 5'-CAG GAA ACA GCT ATG ACA CTT CAG GGT GAC CGA AGA ATC AGA A-3') universal praymerlardan foydalanildi. PZR mahsulotlari 10 ng D NK namunasi, har bir praymerdan 1 µl, 12,5 µl Taq Master Mix (Novoprotein, Guangdong, Xitoy) va ddH₂O dan iborat, jami 25 µl ni tashkil etdi. PZR amplifikatsiyani amalga oshirish uchun dastlab 95°C da 5 daqiqalik dastlabki bosqichdan o'tkazilgan, undan keyin jami 35 sikldan iborat quyidagi ketma-ketlik amalga oshirilgan: 94°C da 45 soniya denaturatsiya, 48°C da 45 soniya va 70°C da 90 soniya elongatsiya. So'nggi bosqich esa

72°C da 10 daqiqadan iborat bo'lib, bu yakuniy bosqich hisoblanadi. Filogenetik daraxt 'Neighbor-Joining' uslubi asosida MEGA7 dasturidan foydalanilgan holda yaratildi (Kumar et al., 2016).

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Qoradaryo, Marg'ilonsoy hamda So'x daryolaridan tutilgan *Cottus spinulosus* namunalari morfologik jihatdan deyarli o'xshash bo'ldi (1-rasm).




1-rasm. *Cottus spinulosus* ning Qoradaryo (A), Marg'ilonsoy (B) hamda So'x (C) daryolaridan tutilgan namunalari [Qoradaryo va Marg'ilonsoydan tutilgan namunalar rasmi muallifi Jörg Freyhof].

Mazkur namunalar tanasining mayda bo'rtiqchalar bilan qoplanganligi, shu bilan birga qorin suzgich qanotining kaltaligi hamda anal teshigiga yetmasligi bilan V.Sideleva (2021) qayd etgan *Cottus spinulosus* deb xulosa qilishga asos bo'ldi. Qolaversa ushbu uch havza toshbuqalarining umumiy ko'rinishi o'zaro o'xshash bo'lib, faqat birozgina tana rangi va undagi dog'larning ifodalanishida farq qildi. Ushbu farqlanishni baliqlar yashash muhitiga moslanish belgisi sifatida baholash mumkin.

BIOLOGIYA

Biroq ushbu uch populyatsiyani mitochondrial COI geni yordamida molekulyar-genetik jihatdan tekshirib ko'rganimizda ular bir-biridan farqli alohida uch kladadan joylashgani ma'lum bo'ldi (2-rasm).



2-rasm. Fargʼona vodiysidan yigʼilgan *Cottus spinulosus* hamda *Cottus jaxartensis* (*Cottus gobio* tashqi guruh [outgroup] sifati) ning ‘Neighbor-Joining’ uslubida yaratilgan filogenetik shajara daraxti

Yuqoridagi filogenetik shajara daraxtidan koʼrinib turibdiki, Qoradaryo, Soʼx hamda Margʼilonsoy havzasi populyatsiyalari oʼzaro alohida shoxlarda joylashgan. Chirchiq havzasida uchrovchi *Cottus jaxartensis* ushbu uch populyatsiyaning filogenetik daraxtidagi umumiyligi qoʼshni turi hisoblanadi. Qoradaryo populyatsiyasi Margʼilonsoy va Soʼx populyatsiyalaridan mos ravishda 0,93% hamda 0,62% genetik masofa (K2P) qayd etdi. Margʼilonsoy hamda Soʼx populyatsiyalari orasidagi genetik masofa ham 0,62% ga teng boʼldi (1-jadval). Ushbu holatda uch populyatsiya orasidagi genetik masofa umumiyligi qabul qilingan turlararo genetik farqlanish koʼrsatkichi (>2%) dan kichik boʼlib, tur ichida farqlanish deb xulosa qilsa boʼladi. Biroq boshqa tomondan *Cottus jaxartensis* hamda *Cottus spinulosus* ning Qoradaryo, Margʼilonsoy hamda Soʼx populyatsiyalari oʼzaro mos tarzda 0,31%, 0,62% va 0,31% genetik farqlanishni namoyon qildi. Yoki tashqi guruh sifatida tanlangan va Markaziy Osiyo suv havzalarida uchramaydigan *Cottus gobio* hamda *Cottus jaxartensis* orasidagi genetik masofa ham 2% dan kichik (1,71%) boʼldi.

1-jadval. *Cottus spinulosus* ning uch populyatsiyasi hamda *Cottus jaxartensis* va *Cottus gobio* orasidagi genetik masofa

		1	2	3	4
	<i>C. spinulosus</i> Qoradaryo				
	<i>C. spinulosus</i>	0,0093			
Marg'ilonsoy					
	<i>C. spinulosus</i> So'x	0,0062	0,0062		
	<i>C. jaxartensis</i> Chirchiq	0,0031	0,0062	0,0031	
	<i>C. gobio</i>	0,0203	0,0235	0,0203	0,0171

Bir tur doirasidagi ayni shunday genetik farqlanish Ozark platosi (AQSh) ning endem turi hisoblanagan *Cottus hypselurus* Robins & Robison, 1985 da ham kuzatilgan (Kinziger & Wood, 2003). Fikrimizcha, *Cottus* urug'i vakillarini genetik jihatdan farqlash uchun mitoxondrial COI barkod geni yetarli emas. Bu o'rinda nisbatan tezroq evolyutsiyalanuvchi boshqa DNK markerlaridan foydalanish (masalan, cytb, CR) maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Yuqorida olingen natijadan xulosa qilish mumkinki, *Cottus spinulosus* ning Farg'ona vodiysi ichki suv havzalaridagi uch populyatsiyasi o'zaro bir-birdan aniq farqlanuvchi genetik kladalardan joy olgan. Ushbu genetik farqlanishning morfologik asoslarini mazkur populyatsiya vakillarini chuqur morfologik tekshirish hamda olingen natijalarni keng qamrovli statistik uslublarda tahlil etish orqali topish lozim. Bu mazkur farqlanish tur ichida yoki turlararo holatda kuzatilayotganiga aniqlik kiritib beradi. Agar tez evolyutsiyalanuvchi DNK markerlari orqali tekshirib ko'rildganda ham yuqoridagidek farqli kladalar kuzatiladigan, shu bilan birga ushbu populyatsiya vakillari orasida ishonchli morfometrik, meristik yoki morfologik farqlar qayd etiladigan bo'lsa, ushbu uch populyatsiya ham o'z navbatida uch alohida turni ifoda etadi. Bu esa Farg'ona vodiysidagi *Cottus* urug'ining tur xilma-xilligi biz avval o'ylagandan ko'ra kengroq ekanligini bildiradi.

Minnatdorchilik. Farg'ona vodiysi suv havzalaridan *Cottus spinulosus* namunalari yig'ishda yaqindan yordam bergan Farg'ona davlat universiteti Zoologiya va umumiy biologiya kafedrasi professor-o'qituvchilari Yorqinoy Qayumova hamda Dildoraxon Komilovalarga hamda Ugom daryosidan *Cottus jaxartensis* namunalari yig'ishda yordam bergan Akbarjon Ro'zimovga o'zimizning samimiyy minnatdorchiligidimizni bildirib o'tamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (eds) 2023. Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. (<http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>). (murojaat etilgan sana: 06.09.2023).
2. Ivanova N.V., Zemlak T.S., Hanner R.H., Hebert P.D.N. Universal primer cocktails for fish DNA barcoding. Molecular Ecology Notes, 2007. Vol. 7(4), – P. 544-548.
3. Kinziger A.P., Wood R.M. Molecular Systematics of the Polytypic Species *Cottus hypselurus* (Teleostei: Cottidae). Copeia, 2003. Vol. 3, – P. 624-627.
4. Kumar S., Stecher G., Tamura K. MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 7.0 for Bigger Datasets. Molecular Biology and Evolution, 2016. Vol. 33(7), – P. 1870-1874.
5. Sheraliyev B.M., Qayumova Y.Q., Komilova D.I. Farg'ona vodiysi suv havzalarida tarqalgan *Cottus spinulosus* Kessler, 1872 ning muhofazasiga oid // "XXI asrda Biologiyaning rivojlanish istiqbollari va ularda innovatsiyalarning ahamiyati" mavzusidagi Respublika ilmiy anjumanini materiallari. Jizzax, 2021, 15-aprel, – B. 243-246.
6. Sideleva V.G. A review of sculpins (Cottoidei) of Middle Asia with a revalidation of the species *Cottus jaxartensis* and description of a new species *Cottus nudus* sp. nova. Journal of Ichthyology, 2021. Vol. 61(3), – P. 327-338.
7. UFR (Use of Fishes in Research) Committee. 2013. Guidelines for the use of fishes in research. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. - <https://asih.org/animal-care-guidelines/> (murojaat etilgan sana: 01.07.2020).
8. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть III. – Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1949. – 926-1382 с.