

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

5-2023

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Aniq va tabiiy fanlar

FIZIKA– TEXNIKA

O‘.B.O‘ljayev, K. Mehmonov, I.D.Yadgarov, U.B.Xalilov

Vodorod adsorbsiyasida grafendagi nuqsonlarning roli 6

A.Sh.Raximov

Avtomobil dvigatellarining asosiy turlari va ish sikli..... 13

Sh.A.Muminova, I.D. Yadgarov, O‘.B. O‘ljayev

Azot atomlarining turli xil haroratdagi uglerodli nanotrubkalarga ta’siri 22

KIMYO

I.R.Asqarov, M.A.Axmadaliev, N.M.Yakubova

Furfuralning xalq iqtisodiyotidagi ahamiyati 28

S.A.Mamatqulova, I.R.AsqarovOddiy arpabodiyon (*Pimpinella anisum L.*) tarkibidagi biologik faol moddalarning antioksidantlik faolligini aniqlash..... 33**X.V.Qoraboyev, N.Sh.Azimov***Indigofera tinctoria* Linn o’simligi tarkibidagi umumiyoq qosil miqdorini o’rganish 39**J.B.Mavlonov, Sh.N.Turemuratov, B.Ch.Nurimbetov, E.A.Eseyova**

Jamansay koni dolomitini o’rganish..... 45

A.A.Xamzaxo‘jayev, M.I.Payg‘amova, G‘.M.Ochilov, R.A.Payg‘amov

Ikkilamchi xomashyolar asosida uglerodli adsorbentlar olish va ularning fizik-kimyoviy xossalari o’rganish 50

X.V.Isroilova, B.Y.Abdug‘aniyev, A.B.Perdebayev

Tashqi iqtisodiy faoliyatda polimerlarning nazariy va huquqiy jihatlari 54

BIOLOGIYA

I.I.ZokirovSabzavot–poliz agrobiotsenozi larida tasodifiy uchrovchi adventivlar
(Markaziy Farg‘ona hududi misolida) 60**M.R.Shermatov***Mythimna unipunctana*ning rivojlanishi hamda morfologik xususiyatlari ozuqa o’simligining ta’siri 64**V.Maxmudov, J.O.Mamarasulov**

Farg‘ona vodiysi florasida burchoqdoshlar (Fabaceae) oilasiga mansub endem turlarni muhofazasi 74

G.M.ZokirovaFarg‘ona vodiysida ilk marta qayd etilgan *Pineus strobi* hartig, 1839 (Hemiptera, Adelgidae)
turining bioekologiyasi 77**A.E.To‘Iqinov**

Plankton organizmlarga xos xususiyatlar tahlili 80

Y.Qayumova, Ch.AbduqaxhorovaIskandariya (*iskandaria prokofiev*, 2009) urug‘i turlarining Farg‘ona vodiysi chuchuk suv havzalari bo‘ylab tarqalishi 83

GEOGRAFIYA

T.J.Jumayev, Sh.B.Qurbanov, E.D.Hamdamov

O‘zbekiston tog‘li hududlarida rekreatsiyani rivojlantirish va hududiy tashkil etishning ba’zi masalalari 87

O.I.Abdug‘aniev, E.G.Mahkamov, H.R.Abdullayeva

Turistik-rekreatsion tizimlarni shakllantirishda mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarini baholash 94

***INDIGOFERA TINCTORIA LINN. O'SIMLIGI TARKIBIDAGI UMUMIY OQSIL MIQDORINI
O'RGANISH***

***INDIGOFERA TINCTORIA LINN. ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В
РАСТЕНИЯХ***

INDIGOFERA TINCTORIA LINN. STUDY OF TOTAL PROTEIN CONTENT OF PLANTS

¹Qoraboyev Xalimjon Valiyevich

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

²Azimov Nurmuhammad Shuhratovich

²Qo'qon davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi o'qituvchisi, kimyo fanlari bo'yicha (PhD)

Annotatsiya

Maqolada Farg'ona viloyatining uch xil (unumdon, sho'rangan, quruq) iqlim-sharoitida yetishtirilgan dukkakililar (*Fabaceae*) oilasiga mansub *Indigofera tinctoria* L. o'simligi poyasi, doni va meva po'chog'inining umumiyl oqsil miqdori o'rganilganligi haqida fikr yuritilgan. Tadqiqotda *Indigofera tinctoria* L. o'simligining umumiyl oqsil miqdorini aniqlashda umume'tirof etilgan usullardan biri Keldal usulidan foydalanildi. Namunalar tarkibidagi oqsil miqdorini Keldal usulida aniqlashda sulfat kislota yordamida gidrolizlash, natriy gidroksid bilan neytrallash, qolgan kislotani ishqor eritmasi bilan titplash bosqichlari amalga oshirildi. Olingan natijalar o'zaro hamda boshqa dukkakli o'simliklar oqsil miqdori bilan taqqoslandi. Tadqiqot natijasiga ko'ra quruq sharoitda yetishtirilgan *Indigofera tinctoria* L. o'simligining donida 25,967 % va meva po'chog'ida 9,539 %, sho'rangan sharoitda esa o'simlik poyasida 5,688 % oqsil mavjudligi aniqlandi.

Аннотация

В статье исследовано содержание общего белка в стебле, зерне и бобе растения *Indigofera tinctoria* L., относящегося к семейству бобовых (*Fabaceae*), выращенного в трех различных (плодородных, засоленных, засушливых) климатических условиях Ферганской области. В работе использован метод Кельдала – один из общепризнанных методов определения содержания общего белка в растении *Indigofera tinctoria* L. При определении количества белка в пробах методом Кельдала проводили стадии гидролиза серной кислотой, нейтрализации гидроксидом натрия и титрования оставшейся кислоты раствором щелочи. Полученные результаты сравнивали между собой и с количеством белка других бобовых растений. По результатам исследования установлено, что зерно *Indigofera tinctoria* L., выращенное в засушливых условиях, содержит 25,967% белка, в плодовой коробочке - 9,539%, в засоленных условиях - в стебле растения - 5,688%.

Abstract

The article examines the total protein content in the stem, grain and bean of the plant *Indigofera tinctoria* L., belonging to the legume family (*Fabaceae*), grown in three different (fertile, saline, arid) climatic conditions of the Fergana region. The Keldal method is used in the work – one of the generally recognized methods for determining the total protein content in the plant *Indigofera tinctoria* L. When determining the amount of protein in the samples by the Keldal method, the stages of hydrolysis with sulfuric acid, neutralization with sodium hydroxide and titration of the remaining acid with an alkali solution were carried out. The results obtained were compared with each other and with the amount of protein from other legumes. According to the results of the study, it was found that the grain of *Indigofera tinctoria* L. grown in arid conditions contains 25.967% protein, in the fruit box - 9.539%, in saline conditions - in the stem of the plant - 5.688%.

Kalit so'zlar: *Indigofera tinctoria* L., umumiyl oqsil, Keldal usuli, gidrolizlash, neytrallash, titplash, poya, don, meva po'chog'i.

Ключевые слова: *Indigofera tinctoria* L., общий белок, метод Кельдала, гидролиз, нейтрализация, титрование, стебель, зерно, стручок.

Key words: *Indigofera tinctoria* L., total protein, Keldahl method, hydrolysis, neutralization, titration, stem, grain, pod.

KIRISH

Qadimdan o'simliklar kimyoviy tarkibi dunyo olimlarini qiziqtirib kelgan va ularni o'rganish uchun yillar davomida tinimsiz ilmiy tadqiqotlar olib borilgan, hozirgi kunda ham ushu ilmiy izlanishlar davom ettirilmoqda.

Dukkakdoshlar (*Fabaceae*) oilasiga mansub bo'lgan o'simliklar kimyoviy tarkibida oqsil, moy, uglevod, vitaminlar, flavonoid, indigoid, makroelementlar, mikroelementlar kabi ko'plab murakkab birikmalarga boy bo'lib, bular orasida *Indigofera* turkumiga mansub o'simliklar alohida ahamiyatga ega.

Indigofera turkumiga mansub o'simliklar kimyoviy tarkibini o'rganish va amaliyatga tatbiq etish insoniyat oldida turgan ko'plab muammolarni hal etishga yordam beradi. Jumladan, qishloq xo'jaligida bu o'simliklarni ekib yetishtirish natijasida unumsiz, kamhosil yerlarning unumdarligini oshiradi, tuproqni azotga boyitadi, olingen yem-xashak mahsulotidan chovachilikda foydalanish hayvonlarning mahsulorligini oshiradi, natijada esa insoniyatni qisman bo'lsa-da oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Indigofera turkumining vakillari ustida juda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Alagbe Jon (Sumitra tadqiqot instituti Gujarat Hindiston, 2020) tomonidan "*Indigofera tinctoria* o'simligi ildiz, poya, bargining oqsil, aminokislota va vitamin tarkibini kimyoviy baholash" nomli tadqiqot ishida *Indigofera tinctoria* o'simligining umumiyoqsil miqdori o'rganilgan va natijada uning bargida 30,53 %, poyasida 5,11 %, ildizida 8,22 % miqdorida oqsilning mavjudligi aniqlangan. [1]

Veena Sharma va Aaastha Agarval (Hindiston 2015) tomonidan "*Indigofera tinctoria Linn* yer ustki qismlari metanol va gidrometanol ekstraktining fizik-kimyoviy va antioksidant tahlillari" nomli tadqiqot ishida *indigofera tinctorianing* metanol va gidrometanol ekstrakti tarkibida aminokislotalar, oqsillar borligi aniqlangan. [2]


M.K. Gafar, A.U. Itodo, F.A. Atiku, A.M. Hassan va I.J. Peni tomonidan (Nigeriya 2011) "Tukli indigo (*indigofera astragalina*) barglarining umumiyoqsil miqdori" nomli tadqiqot ishida *indigofera astragalina* barglarining tarkibida 8,23 % oqsil borligi aniqlangan. [3]

Tadqiqot jarayonida biz tomonimizdan o'rganilayotgan obyekt *indigofera tinctoria* o'simligi tarkibidagi umumiyoqsil miqdorini aniqlashda xalqaro darajada keng qo'llanilayotgan usullaridan biri Keldal usulidan foydalanildi.


TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMASI

Mahalliy iqlim sharoitida yetishtirilgan *Indigofera tinctoria* o'simligining ildiz va bargiga nisbatan poya va doni o'simlik umumiyoqsil miqdorini aniqlashda xalqaro darajada keng qo'llanilayotgan usullaridan biri Keldal usulidan foydalanildi.

Umumiyoqsil miqdorini aniqlash usullaridan biri Keldal usulidir. Bu bo'yicha azot miqdorini aniqlash orqali umumiyoqsil miqdori hisoblashdan iborat. Usulning mohiyati namunadagi organik moddalarni konsentrangan sulfat kislota yordamida gidroliz qilib (oqsil tarkibidagi amin guruhlarini) ammoniy sulfat tuzlarini hosil qilishdan iborat:



Gidroliz tugaganidan so'ng hosil bo'lgan ammoniy sulfatni ammiakka aylantirish uchun natriy gidroksid ta'sir ettirildi.



Neytrallanish natijada hosil bo'lgan ammiak yoki ammoniy gidroksid sulfat kislota eritmasiga yuttiirildi. Qolgan kislota ishqor eritmasi bilan titrlandi. Hisoblab topilgan ammiak miqdoridan azot miqdori hisoblangdi. O'r ganilayotgan namunaning o'rtacha maydalangan bir jinsli namunasidan probirkaga tahlil qilish uchun aniq namuna tortildi, xatolik darajasi 0.1% dan oshmasligi kerak. Namuna miqdori jihatdan Keldal kolbasida o'tkaziladi. Keyinchalik tajriba davomi ko'rsatmaga muvofiq amalga oshiriladi [4].

Olingen natijalarini qayta ishlash: tahlil qilinayotgan namunadagi azotning (X) massa ulushi ammiakni suyultirilgan sulfat kislotadan o'tkazib qolgan miqdorni titrlashdan keyingi hajm orqali namuna massasiga nisbatan foizda formula bo'yicha hisoblab topiladi.

$$X = \frac{(\text{V}_1 - \text{V}_0) * K * 0.0014}{m} * 100\%$$

V_1 – dastlabki 0.1 mol/l natriy gidroksid eritmasining hajmi, ml.;

V_0 – namuna tajribasida ortib qolgan 0.1 mol/l sulfat kislota eritmasini titrlash uchun sarflangan 0.1 mol/l natriy gidroksid eritmasining hajmi, ml.;

m – tahlil uchun olingen namuna massasi, gr.

1-jadval

Tahlil natijalariga ko'ra *indigofera tinctoria* o'sinligi tarkibida umumiyoqsil miqdori quyidagicha ekanligi aniqlandi.

KIMYO

| Nº | <i>Indigofera tinctoria</i> organlari | Umumiy oqsillar miqdori, % | (Alagbe Jon) ndiston 2020 (%) |
|----|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Poya ¹ | 2,0125 | 5,11 |
| 2 | Poya ² | 5,688 | |
| 3 | Poya ³ | 5,112 | |
| 4 | Don ¹ | 21,475 | |
| 5 | Don ² | 22,002 | |
| 6 | Don ³ | 25,967 | |
| 7 | Meva qobig'i ¹ | 7,978 | |
| 8 | Meva qobig'i ² | 6,924 | |
| 9 | Meva qobig'i ³ | 9,539 | |

Jadvalda keltirilgan 1, 2, 3 raqamlariga izoh: tadqiqot 3 ta hududda olib borilgan, bu jadvalda keltirilgan 1-tadqiqot hududi Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani Katta Qorako'l MFY da joylashgan "Abdurazzoq – Muxtorjon Yuksalish" fermer xo'jaligi yer maydoni (unumdon tuproq); 2-tadqiqot hududi Farg'ona viloyatining Dang'ara tumani Bog'ish MFY da joylashgan "Dang'ara ko'p tarmoqli texnikumi" ning yer maydoni (sho'rangan tuproq); 3- tadqiqot hududi Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani Sariqo'rg'on MFY da joylashgan Qo'qon davlat pedagogika instituti tasarrufidagi dam olish maskani yer maydoni (quruq tuproq).




1-rasm. *Indigofera tinctoria* L. o'simligi; a) poyasi, b) yetilib pishgan dukkagi, c) doni, d) meva qobig'i (po'chog'i)

2-jadval


Indigofera tinctoria o'simligi oqsil miqdorini boshqa dukkakli o'simliklar bilan farqi

| Nº | Ekin va hosil turi | Oqsil |
|----|-----------------------------|-------|
| 1 | Soya (doni) | 29 |
| 2 | Indigofera tinctoria (doni) | 26 |
| 3 | Rus no'xati (doni) | 20 |
| | Loviya (doni) | 1 |
| | | 8 |
| | Beda (ko'k massa) | 3 |

Olingan natijalarni diagramma shaklida ifodalash, ushbu o'simlik organlaridagi oqsil miqdorining qanchalik bir-biriga yaqinligi yoki farqini ko'rsatib beradi. Quyida diagrammalar keltirilgan.




1-rasm. 3 ta tajriba maydonchasida yetishtirilgan *Indigofera tinctoria* o'simligi poyalarining oqsil miqdorlari




2-rasm. Donlarining oqsil miqdorlari


KIMYO




3-rasm. Meva qobiqlarining oqsil miqdorlari



4-rasm. 1-tajriba maydonidagi *indigofera tinctoria* o'simligining oqsil miqdorlari



5-rasm. 2-tajriba maydonidagi *indigofera tinctoria* o'simligining oqsil miqdorlari6-rasm. 3-tajriba maydonidagi *Indigofera tinctoria* o'simligining oqsil miqdorlari**XULOSA**

Uchta tajriba maydonchasida yetishtirilgan *indigofera tinctoria* o'simligining umumiy oqsil miqdori taqqoslanganda Sariqo'rg'on hududida (quruq va toshloq maydon) yetishtirilgan doni tarkibida eng ko'p 25,967 % bo'lib, Abdurazzoq – Muxtorjon Yuksalish fermer xo'jaligi hududida (unumdar maydon) yetishtirilgan poya tarkibida esa eng kam 2,0125 % ligi aniqlandi. Poyalar tarkibidagi oqsillar miqdori o'zaro taqqoslanganda Dang'ara hududida (sho'rangan tuproq) yetishtirilgan o'simlik poyasida eng ko'p 5,688 %, donlari taqqoslanganda Sariqo'rg'on hududida yetishtirilgan doni tarkibida eng ko'p 25,967 %, meva po'choqlari taqqoslanganda ham Sariqo'rg'on hududidan olingen meva po'chog'i tarkibida eng ko'p 9,539 % ligi aniqlandi.

Har bir hududdan olingen *indigofera tinctoria* o'simligining poya – don – meva po'chog'i qismlari o'zaro taqqoslanganda umumiy oqsil miqdori poyada eng kam, donda eng ko'p, meva po'chog'ida esa poya va donga nisbatan o'tacha miqdorda ekanligi aniqlandi.

Demak, sho'rangan tuproqlarda unumdar va quruq tuproqlarga nisbatan *indigofera* turkumi o'simliklarining poyasida, yer sathining nisbatan yuqori adirlik kabi quruq hududlarida esa sho'rangan va unumdar tuproqlarga nisbatan o'simlikning doni hamda meva po'chog'ida ko'proq oqsil jamg'ariladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alagbe John //Chemical evaluation of proximate, vitamin and amino acid profile of leaf, stem bark and root of *indigofera tinctoria*// International Journal on Integrated Education. Volume 3, Issue X, Sumitra Research Institute, Gujarat, India. October 2020. 150-157.
2. Veena Sharma and Aaastha Agarval //Physicochemical and Antioxidant Assays of Methanol and Hydromethanol Extract of Ariel Parts of *Indigofera Tinctoria Linn*// Journal of Pharmaceutical Sciences. Indian 2015. 729-734.
3. M.K. Gafar, A.U. Itodo, F.A. Atiku, A.M. Hassan and I.J. Peni //Proximate and Mineral Composition of the Leaves of Hairy Indigo (*Indigofera astragalina*)// Pakistan Journal of Nutrition 10 (2) 2011. 168-175.
4. Методы контроля. Химические факторы. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. Руководство Р 4.1.1672-03. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.
5. Sattarov J., Sidiqov S., Abdullayev S. va boshqalar. Agrokimyo. Darslik.– Toshkent: "Cholpon", 2011. 56-b.
6. Джумаев Ф.Х., Атаева З.А. Выращивание растения «*Indigofera tinctoria* L» и его роль в повышении плодородия почв в условиях Бухарской области // Вестник науки и образования № 3(106). Часть 2. 2021. –С. 6-8
7. Гиляров М. С. *indigofera*. Биологический энциклопедический словарь, 1986, с. 229 б.
8. Yakubov G.K. Cultivation Indigosfers in the soil and climatic conditions of Khorezm and the technology of obtaining a natural dye // Agrarian science for agriculture: collection of articles: in 3 books. / V International Scientific and Practical Conference (March 17-18, 2010) Barnaul: Publishing house of AGAU, 2010. Book. 1. -S. 420-421.
9. <https://ru.fwiki.wiki/wiki/Indigotier>.
10. http://www.absoluteastronomy.com/topics/Indigofera_tinctoria