

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

4-2023

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Aniq va tabiiy fanlar

FIZIKA-TEXNIKA

G.B.Samatov

Akademik litseylar va oliy ta'lif muassasalarida kvant fizikasini izchilllik tamoyili asosida o'qitish..... 6

G.A.Umarova

Fizik masalalarni yechishda modellashtirish ishlarini amalgalashish prinsiplari 12

M.T.Normuradov, K.T.Dovranov, K.T.Davranov, M.A.Davlatov

Yupqa kremniy va kremniy oksidli plynokalarni ftir tahlili 20

KIMYO

A.A. Orazbayeva, B.S.Zakirov, B.X.Kucharov, M.B.Eshpulatova, Z.K.Djumanova

Formalin-urotropin-mis sulfat sistemasining o'zaro tasiri..... 28

I.R.Asqarov, D.T.Xasanova

Bug'doy asosida yangi oziq-ovqat qo'shilimalari olish va ularning kimyoviy tarkibi 32

I.R. Asqarov, I.I. Xomidov

Ziziphus jujuba o'simligi mevasining kimyoviy tarkibi va xalq tabobatida qo'llanilishi 36

I.I.Achilov, M.M. Baltaeva

Izobutilpiridin xloridni sellyuloza erituvchisi sifatida qo'llashning ilmiy va amaliy jihatlari..... 41

G.Q.Xoliqova, Q.G'.Avezov, B.Sh.Ganiyev, O'.M.Mardonov,

Mochevina nitrat tuzi va nitrat kislotalar bilan qayta ishlangan fosforitlarining rentgen fazaviy tahlili 44

G.T.Abdullayeva, Z.B. Xosilova

Mitoxondriya membranasi o'tkazuvchanligiga o'simlik alkaloidlarining ta'siri..... 50

I.R.Asqarov, N.A.Razzakov

Valeriyananing kimyoviy tarkibi va xalq tabobatidagi ahamiyati 55

R.A.Payg'amov, Sh.M.Xoshimov, G'.M.Ochilov, N.N.Raxmonaliyeva, I.D.Eshmetov

Daraxt chiqindisi asosida olingan ko'mirlarda benzolga nisbatan adsorbsion faolligi o'zgarishini o'rGANISH 58

I.R.Asqarov, N.A.Razzakov

Lavandanining kimyoviy tarkibi 65

I.R.Asqarov, N.A.Razzakov

Dorivor oltin tomir o'simligining flavonoid tarkibi 68

I.R.Asqarov, G'.O'.To'ychiev

Jig'ildon qaynashi kasalligida qo'llaniladigan dori vositalari va ularning kimyoviy tarkibi 71

I.R.Asqarov, M.Noibjonova

Zubturum o'simlididan olingan "as-an" oziq-ovqat qo'shilmasining antioksidant faolligini o'rGANISH 75

A.X.Xaitbayev, S.S.Xaydarova

Charophyceae tarkibidan alginatlar ajratib olish va xossalarni o'rGANISH 80

I.R.Asqarov, M.M.Mo'minjonov, Z.A.Kamalova

Buyrak va siyidik pufagi kasalliklarida ishlataladigan ayrim sintetik dori vositalarining kimyoviy tarkibi 90

M.O.Rasulova, O.M.Nazarov

Teri tarkibidagi mineral moddalarning miqdoriy tarkibini aniqlash 94

BIOLOGIYA

I.I.Zokirov, B.A.Abduvealiyev

Uy (xonaki) parrandalarning gelmintlari haqida ayrim ma'lumotlar..... 100

Yo.Qayumova, D.E.Urmonova

O'zbekiston eksklavlari-Shohimardon va So'x ixtiofaunalarining qiyosiy tahlili 105

M.R.Shermatov

Tangachaqanotli hasharotlar (insecta: lepidoptera)arealining kengayib borishida muhit omillarining ahamiyati..... 110

**O'ZBEKİSTON EKSİKLAVLARI – SHOHİMARDON VA SO'X İXTİOFAUNALARINİNG
QİYOSIY TAHLİLİ.**

**ЭКСКЛАВЫ УЗБЕКИСТАНА — СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИХТИОФАУНАЛОВ
ШАХИМАРДАНА И СОХА.**

**EXCLAVAS OF UZBEKISTAN – COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ICHTHIOFAUNALS
OF SHAKHIMARDAN AND SOKH**

Qayumova Yorqinoy Qobilovna¹, Urmonova Dilafruz Erkinovna²

¹Qayumova Yorqinoy Qobilovna
²Urmonova Dilafruz Erkinovna

– Farg'ona davlat universiteti katta o'qtuvchisi PhD
– Farg'ona davlat universiteti o'qtuvchisi

Annotatsiya

So'x daryosi Sirdaryoning chap irmog'i bo'lib, daryoning baliqlar faunasini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar soni juda ham cheklangan. Mazkur maqolada So'x ixtiofaunasining ayni vaqtdagi vakillari haqida so'z boradi. Unga ko'ra, daryoda 3 turdag'i baliq uchrashi qayd etilgan. Shular orasida Triplophysa daryosi balig'l ularning endemik turi hisoblanadi.

Аннотация

Река Сох является левым притоком Сырдарьи, и количество исследований, посвященных изучению ихтиофауны реки, весьма ограничено. В данной статье говорится одновременно о представителях ихтиофауны Соха. Согласно ей, в реке зарегистрировано 3 вида рыб. Среди них река Триплофиза - их эндемичный вид.

Abstract

*The Sokh River is a left tributary of the Syrdarya, and the number of researches devoted to the study of the fish fauna of the river is limited. This article provides primary information about the representatives of the fish fauna of the Sokh River. According to the results of the research, 3 fish species were recorded in the river. Among them, *Triplophysa daryoae* is an endemic species of the Sokh River.*

Kalit so'zlar: endemik tur, chuchuk suv, Farg'ona vodiysi, tog'baliqlari, ixtiofauna.

Ключевые слова: эндемичные виды, пресные воды, Ферганская долина, возвышенности, ихтиофауна.

Key words: fish diversity, Fergana Valley, freshwater fishes, Sokh River, taxonomy.

KIRISH

Sirdaryo suv havzasi Markaziy Osiyodagi eng yirik daryo hisoblanib, hajmi bo'yicha Amudaryordan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Farg'ona vodiysida Norin va Qoradaryolarning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Sirdaryoning chap irmoqlaridan biri bo'lgan So'x daryosi O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi eksklavi hisoblangan So'x tumani hududidan oqib o'tadi [1]. So'x Oloy tog' tizmasining shimoliy yon bag'irlarida Oq -Terek va Xo'ja -Achqon daryolarining qo'shilishidan hosil bo'lgan 3000 m dan ortiq balandlikda joylashgan Qo'rg'on qishlog'i yaqinidan boshlanadi. Asosan shimolga qarab oqadi. O'rta oqimida u So'x viloyati (O'zbekiston eksklavi) suv bilan ta'minlanishining asosiy manbasi bo'lib xizmat qiladi. Farg'ona vodiysida u sug'orish uchun butunlay qismlarga ajralgan, 1940-yillardning oxiridan beri Sirdaryoga yetib bormaydi [2]. Hozirgi vaqtgacha So'x daryosining ixtiofaunasi o'rganilmagan [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Shohimardon suv havzasi ham O'zbekiston va Qirg'iziston hududlaridan oqib o'tuvchi daryo bo'lib, Sirdaryoning chap irmog'i O'zbekistonning eksklavi hududida, Oloy va Turkiston tizmalarining shimoliy yonbag'irlaridan boshlanuvchi Oqsuv va Ko'ksuvning qo'shilishidan boshlanadi. Doimiy suv oqimiga ega bo'lib, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan kesib o'tib, Vodil qishlog'ida Farg'ona vodiysiga kirib Marg'ilonsoyni hosil qiladi Oltiariq hududida Katta Farg'ona kanaliga qo'shiladi hamda daryo suvlari sug'orish maqsadida drenaj kanallarga ajraladi[21].

Ushbu maqolada O'zbekiston eksklavlaridan oqib o'tuvchi Shohimardon va So'x daryolarining ixtiofaunasi o'rganilmaganligi sababli, ilmiy tadqiqot ishida ushbu daryolar suv

havzalarining ixtiofaunasini o'rganish hamda baliqlarni taksonomik jihatdan tahlil etish maqsad qilib olingan.

MATERIAL VA USLUBIYAT

Tadqiqotda 2021-2022 yillar davomida Farg'ona vodiysi idagi So'x va Shohimardon suv havzalarining yuqori, o'rta, quyi oqimlaridan 2021-2022 yillarning iyul-avgust oylarida tutilgan baliq namunalari asos bo'ldi. Tutilgan baliq namunalari anesteziya qilinganidan so'ng 10 foizli formalin eritmasida fiksatsiya qilindi. 48 soat o'tgach doimiy saqlash uchun 70% li etil spirtga ko'chirildi. Namunalar Farg'ona davlat universitetining zoologiya va umumiy biologiya kafedrasi laboratoriysi muzeyiga joylashtirilgan.

Namunalarni o'lchashda 0,01 mm aniqlikdagi raqamli shtangensirkul hamda 0,1 g aniqlikdagi elektron tarozidan foydalanilgan. Baliq namunalarini morfometrik o'lchashda Thoni et al. 2017 [23], B.Sheraliyev va Z.Peng[22] maqolasida keltirilgan uslubdan foydalanildi.

TADQIQOTNING NATIJA VA MUHOKAMASI

So'x va Shohimardon daryolariga oid dastlabki ilmiy tadqiqot ishlarini B.Sheraliyev, Z.Peng (2021-2022) kabi ixtiolog olimlar boshlab berdilar. Vodiyyagi Shoximardon va So'x daryolari ixtiofaunasi alohida tadqiq etgan ishlar mavjud bo'lmasa-da ular bir qator tadqiqotlar ichida qisman o'rganilgan. Ayni vaqtida ushbu daryolarning tur tarkibi, ularning tarqalishi, baliqlar populyatsiyasining hozirgi kundagi holati bo'yicha fundamental ishlarni amalga oshirishni taqozo etadi. So'x daryosi Farg'ona vodiysi idagi atrofi tog'lar bilan o'ralgan hududlardan biri bo'lgan So'x tumanidan oqib o'tadi va o'ziga xos ixtiofaunaga ega. Ushbu daryoda turlar soni kam bo'lsa-da, endemik turlarga ega bo'lganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Turkiston toshbuqasi *C. Spinulosus* Kessler 1872-Sirdaryo havzasining yuqori oqimida uchraydigan mintaqqa endemik turi bo'lib, uning soni yildan-yilga kamayib ketmoqda. Hozirda mazkur tur Farg'ona vodiysida Norin va Qoradaryoda, shuningdek, ayrimsovuvli kichik tog' irmoqlarida uchrashi qayd etilgan. [3]. Shu bilan birga *C. Spinulosus* bizning kuzatuvlarimizda O'zbekiston tumanidan oqib o'tuvchi Nayman soy havzasida uchrashi ham qayd etildi. O'zbekistondan tashqari ushbu baliq turi Farg'ona vodiysining Qirg'iziston hududida uchrashi ma'lum[4]. Sirdaryo havzasidan tashqari Talas suv havzasida ilk marotaba 2017-yilda qayd etilgan [5].

Olib borgan kuzatuvlarimiz natijasiga ko'ra ushbu tur So'x daryosida uchrashi aniqlanildi, lekin, *C. Spinulosus* daryoning asosiy o'zanida emas, ko'proq uning atrofidagi kichik irmoqlarida va ariqlarda baliq populyatsiyalari uchrayotganligi kuzatildi. Ushbu tur hozirda tabiatni muhofaza qilish xalqaro itiffoqi tomonidan yuritiluvchi hayvon va o'simliklarning Xalqaro qizil ro'yxati ning 2020-yilgi nashriga *C. spinulosus* ilk marotaba "Kamroq xafv ostida bo'lgan turlar" [LC – Least Concern] maqomi ostida kiritildi [6]. Shuningdek, ushbu tur kuzatuvlarimizda Shohimardon soyning yuqori, o'rta va quyi oqimlarida va uning atrofidagi kichik suv havzalarida uchrashi qayd etilmadi.

Schizothorax eurystomus Kessler, 1872. Ushbu baliq mahalliy tur bo'lib, O'zbekiston tog' daryolarida keng tarqalgan. Amudaryoning yuqori oqimi, Surxon, Pomir, Qashqadaryo, Zarafshon, Norin, Susamir daryolarida hayot kechiradigan[17] tur hisoblanadi. **Schizothorax eurystomus** So'x daryosining asosiy dominant turi. Daryoning o'rta, quyi oqimlarida va irmoqlarida baliq populyatsiyalarini ko'plab uchrashi kuzatildi. Shohimardon soyning daryosining ham asosiy dominant turi bo'lib, baliq populyatsiyalari soyning yuqori, o'rta, quyi oqimlarida hamda kichik irmoqlari bo'lgan Oltariqsoyda, kichik kanallarda katta populyatsiyalarini uchrashi kuzatildi. Shu bilan *Schizothorax eurystomus* Farg'ona vodiysining eng yirik daryolari Sirdaryo, Qoradaryo, Norin daryolari va Katta Farg'ona kanali, Isfayramsoy, Naymansoy, Chodaksoylarda keng tarqalganligi qayd etildi. Uning tanasi cho'ziq, oval shaklidagi mayda, anal suzgichi atrofida biroz yirik plastinkasimon tangachalar bilan qoplangan. Orqa suzgichi qanoti –III 8, anal suzgichi qanoti – III 6, ko'krak suzgichi qanoti – I 15-16, qorin suzgichi qanoti – I 8 va dum suzgichi qanoti – 24 nurdan iborat, Yon chizig'ida 94-104 tangachalar mavjud [16].

Farg'ona yalangbalig'i – *Triphophysa ferganaensis* Sheraliev & Peng, 2021. Farg'ona vodiysi suv havzalaridan 2021-yilda kashf qilingan lokal endemik tur hisoblanib, ushbu baliq Shohimardonsoning yuqori oqimi bo'lgan Oqsuv qismida qayd qilingan. Ushbu baliq fevral oyidagi kuzatuvlarimizda daryoning tez oquvchi asosiy o'zanida kam uchragan bo'lsa-da, lekin, o'zan oldidagi kichik suv irmoqchalarida baliq populyatsiyasining uchrashi kuzatildi. Suv harorati asosiy

BIOLOGIYA

o'zanda +70 ni, atrofidagi irmoqchalarda esa ikki gradusga farq qilib +90 haroratni tashkil etdi. Irmoqchalarda asosiy o'zanga nisbatan suv o'tlarining ko'plab bo'lishi baliqlarning asosiy o'zanga nisbatan ko'proq uchrashiga olib kelgan bo'lsa kerak. 2022-yil qish oyidagi kuzatuvlarimizda *Triplophysa ferganaensis* Shohimardonsoyning Vodil qishlog'idagi o'rta oqimlarida katta populyatsiyasining uchrashi ilk marotaba qayd etildi. Soyning quyi oqimlari Marg'ilonsoy va Oltariqsoyda ushbu baliq turi mavjudligi aniqlanilmadi.

Triplophysa ferganaensis ning tanasi uzunchoq, ikki yon tomondan asta siqilib boradi. Tanasining baland qismi boshining ensa qismidan boshlab orqa suzgich qanot asosidan biroz oldindi qismigacha o'sib boradi. Tana balandligining maksimal qismi orqa suzgich qanotdan biroz oldinroqda joylashgan bo'lib, standart uzunlikning 14,3-19,5% qismini tashkil qiladi. Boshi o'rtacha uzunlikda, boshqa *Triplophysa* urug'iga xos xususiyat old va orqa burun teshiklari o'zaro yaqin joylashgan. Og'zi pastki, uch juft mo'ylovi bor. Ko'zlarini o'rtacha kattalikda. Boshida ikki ko'zining pastki sohasida hamda ko'krak suzgich qanotining ustki yuzasi ko'payish davrida (erkaklarida) mayda bo'rtiqchalar bilan qoplanadi. [11].

Triplophysa daryoae Sherlev, Qayumova & Peng, 2022 – So'x yalangbalig'i. Ushbu tur 2022-yilda So'x daryosidan kashf etilgan bo'lib [12], ayni vaqtida So'x daryosining yagona endemik turi hisoblanadi. So'x yalangbalig'i So'x daryosining So'x tumanidan oqib o'quvchi barcha qismida daryoning asosiy o'zanida uchraydi. Lekin, So'x daryosining Rishton tumaniga kirgan qismlarida va vodiyning boshqa tog' daryolarida qayd etilmadi. So'x yalangbalig'ining o'rtacha 49-94 mm uzunlikda bo'lib, Shohimardonsoy suv havzasidagi *Triplophysa ferganaensis* yalangbalig'iga ba'zi belgilarga morfologik jihatdan o'xshash bo'lsa-da, lekin, vodiyning boshqa yalangbaliq turlaridan qator belgilarni kombinatsiyasi, jumladan, dum shaklining kesikligi, hamda undagi shoxlangan nurlarning 13-14 ta bo'lishi, suzgich pufagining rivojlanmaganligi, birinchi jabra ravog'idagi nurlar sonining 9-10 ta bo'lishi va tanasidagi dog'larining aniq bir shaklga ega emasligi bilan farqlanadi[12].

Triplophysa strauchii (Kessler, 1874) Ilk marotaba Qozog'istonning Balxash ko'li havzasidan Kessler tomonidan *Diplophysa* urug'i vakili sifatida kashf qilingan. Keyinchalik Berg (1949) tomonidan uning sistematik o'rnini Nemacheilus urug'iga o'zgartiriladi, biroq oxirgi tadqiqotlar natijasiga ko'ra uning aynan *Triplophysa* urug'iga mansubligi ma'lum bo'ldi [8, 9, 10]. *Triplophysa strauchii* hozirgi vaqtida Farg'ona vodiysi chuchuk suv daryolari va ularning irmoqlarida uchrovchi yalangbaliqlar ichida eng keng tarqalayotgan dominant tur hisoblanadi. *T. strauchii* (Kessler, 1874) vodiyning deyarli barcha suv havzalarida [7] uchraydi. Ushbu yalangbaliq turi bizning kuzatuvlarimizda So'x daryosining o'rta va quyi oqimlarida uchrashi qayd etilmadi. Shoximardonsoyning yuqori oqimida ham kuzatilmadi. Suv havzasining o'rta oqimi Vodil qishlog'idan oqib o'tuvchi qismlarida esa, ko'plab baliqlar populyatsiyasini kuzatish mumkin. Shu bilan birga Shohimardonsoyning quyi oqimlari hisoblangan Oltariqsoyda ham *Triplophysa strauchii*, *Schizothorax eurystomus*, *Pseudorasbora parva* baliqlari bilan birgalikda yashayotganligi aniqlanildi. Shoximardonsoyning ya'na bir quyi oqimi, Farg'ona shahridan oqib o'tuvchi Marg'ilonsoyda ham *T. Strauchiin* ko'plab populyatsiyalari kuzatildi.

Pseudorasbora parva – Amur chebakchasi (Temminck & Schlegel, 1846). Ushbu baliq Cypriniformes turkumi, Gobionidae oilasiga mansub bo'lib, vatani Yaponiya, Xitoy, Koreya va Amur daryosi hisoblanadi. Tinch okeaniga quyiladigan, chuchuk Osiyo daryolari havzalarida yashaydi. Orol dengizi havzasida oldin uchramagan. 1960 – yillarda uzoq sharq o'simlikxo'r baliqlari oq amur va xumbosh baliqlarining chavoqlari bilan tasodifan kelib qolgan [13]. Baliqchilik xo'jaliklaridan daryoga va undan butun respublika suv havzalariga tarqalgan, barcha daryolarning tekislik suv havzalarida uchraydi. Xitoy faunistik majmuasi vakili. Tasodifan iqlimlashtirilgan bo'lib, vodiyyagini biologiyasi umuman o'rganilmagan[1], keyingi vaqtarda *Pseudorasbora parva* balig'i vodiyning ichki chuchuk suv havzalarida uchratish mumkin. Shuningdek, bizning tadqiqotlarimizda ushbu baliq turi So'x daryosining o'rta, quyi oqimlarida kuzatilmasada, Shohimardonsoyning quyi oqimlari bo'lgan Oltariqsoyda va Marg'ilonsoyning Farg'ona shahar xudidan oqib o'tuvchi kichik irmoqlarda ham uchrashi aniqlanildi.

Iskandaria kuschakewitschi (herzenstein, 1890) ilk marotaba O'zbekistonning Farg'ona vodiysidan oqib o'tuvchi Sirdaryo havzasiga qarashli Marg'ilonsoy suv havzasidan Herzenstein (1890) tomonidan Nemachilus urug'i vakili sifatida ilk marotaba kashf qilingan. Keyinchalik, Berg

(1905) uning Sirdaryoning Marg'ilon hamda Andijon qismidagi suv havzalarida uchrashini keltirib o'tadi [14]. Mazkur tur balig'i bizning tadqiqotlarimizda So'x va Shohimardonsoyning yuqori, o'rta oqimlarida uchrashi qayd etilmadi, faqatgina Shohimardonsoyning quyi oqimi bo'lgan Oltariqsoydan bir dona vakilini ushlashga muvofiq bo'ldik. Ushbu turning tarqalishi bo'yicha tadqiqotlarimizni davom ettirishimiz zarur.

Orqa suzgich qanoti — i 7, anal suzgich qanoti — i 5, ko'krak suzgich qanoti — i 10–13, qorin suzgich qanoti — i 6-7 va dum suzgich qanoti 8+8. Dum suzgich qanoti ayri, ichkari yumaloq. Dum bandi uzun, standart tana uzunligining 19,8-23,8% ini tashkil qiladi. Dum bandining balandligi esa kichik bo'lib, standart uzunlikning 4,4-5,4% iga teng. Dum bandi uzunligi va balandligi orasidagi nisbat 3,9-5,0 ni tashkil qiladi. Boshi tanasining 1/5 ga teng bo'lib, standart uzunlikning 18,7-22,9% ini tashkil qiladi[15].

Glyptosternon oschanini — Oshanin laqqachasi Sirdaryo havzasining endemik turi bo'lib, ayni vaqtida O'zbekiston va Qirg'iziston hudida uchraydi. Shohimardonsoy quyi oqimi Marg'ilonsoy kanalidan u ilk marotaba qayd etildi[20]. Tabiatan kamyob bo'lgan ushbu tur O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi [18] va Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi (TMXI)ning Qizil ro'yxatiga [19] kiritilgan. 2022-yilgi kuzatuvalarimizda Oshanin laqqachasini Farg'ona vodiysining Namangan viloyatidan oqib o'tuvchi Chodaksoy suv havzasida uchrashi ham ilk marotaba qayd etildi. Oshanin laqqachasi tanasi siliq, tangachasiz, rangi och jigarrang-kulrangdan to zangori siyyohranggacha, orqa tomonida mayda dog'lari mayjud. Boshi yassi, ko'zlar boshining ustki qismida joylashgan, mayda (HL ning 6,1–8,0% i), jami to'rt juft bo'lgan burun, jag'usti, tashqi va ichki jag'osti mo'ylovlar uzun. Dum suzgich qanotining chetki qismi qora rangda. Suzgich qanotlarining formulasi quyidagicha:D i 6 (12), A i 5 (12), P i 10 (12), V i 5 (12), C i 8+8 i (3), i8+7i(6),i7+7i(1) [20].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, So'x va Shohimardonsoy daryolarining ixtiofaunasini qiyosiy o'rghanish davomida Shohimardonsoy daryosining yuqori oqimida asosan baliqlarning ikki turning mavjudligi qayd etildi va yuqori oqimlari uchun dominant tur *Triplophysa ferganaensis* ekanligi aniqlanildi. Uning o'rta va quyi oqimlarida turlar sonining xilma-xilligining ortishi kuzatilib, o'rta oqimlarida *Triplophysa ferganaensis*, *Triplophysa strauchii*, *Schizothorax eurystomus* baliqlarining uchrashi kuzatildi. *Triplophysa ferganaensis*ning Shohimardonsoyning o'rta oqimida uchrashi ushbu tur balig'ining arealini kengayib borayotganligini bildiradi. Uning quyi oqimlari hisoblangan Oltariqsoy va Marg'ilonsoy ixtiofaunalarining birmuncha yuqori ekanligi qayd etildi. So'x daryosi ham tog' baliqlari uchun muhim yashash muhitini bo'lib, uning o'rta oqimlarida asosan *Triplophysa daryoae*, *Schizothorax eurystomus*, *C. Spinulosus* tarqalgan. Daryoning quyi oqimlarida esa *Triplophysa daryoae*ning mavjudligi kuzatilmadi.

SHOHIMARDON VA SO'X DARYOLARIDAGI BALIQLARNING UCHRASH DARAJALARI BO'YICHA QIYOSIY TAHLILI

Baliq turlari	Shohimardonsoy daryosi				So'x daryosi		
	yuqori	o'rta	quyi		yuqori	o'rta	quyi
	Shohimardon soy	Shohimardon soy	Marg'ilon soy	Oltariqsoy			
<i>Cottus spinulosus</i>	-	-	-	-	-	+++	-
<i>Schizothorax eurystomus</i>	++	++	+++	+++	-	+	+
<i>Triplophysa ferganaensis</i>	+++	++	-	-	-	-	-
<i>Triplophysa daryoae</i>	-	-	-	-	+++	-	-
<i>Triplophysa strauchii</i>	-	++	+++	++	-	-	-
<i>Pseudorasbora parva</i>	-	-	++	++	-	-	-
<i>Iskandaria kuschakewitschi</i>	-	-	+	+	-	-	-
<i>Glyptosternon</i>	-	-	-	++	-	-	-

BIOLOGIYA

oschanini							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Izoh. (+) mavjud kam tarqalgan, (-) mavjud emas, (++)-o'rtacha tarqalgan, (+++) ko'p tarqalgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sheraliev B., Kayumova Y., Peng Z. *Triplophysa daryoae*, a new nemacheilid loach species (Teleostei, Nemacheilidae) from the Syr Darya basin, Central Asia. Zookeys, 2022. Vol. 1125, –Р. 47-67.
2. Cox // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд.-М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.
3. Mirzaev U.T. (2019). Turkiston shaytonbalig'i (toshbuqasi). a. Muhamarr J.A. Azimov, *O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi*. b *Hayvonlar* (117). Toshkent: Chinor.
4. Kustareva L.A. & Naseka A.M. (2015) Fish diversity in Kyrgyzstan: Species composition, fisheries and management problems. *Aquatic Ecosystem Health & Management*, 18 (2), 149-159.
5. Vanina T. & Stejskal V. (2017) A New Record of *Cottus spinulosus* in the Talas River Watershed Kazakhstan Central Asia. *Journal of Ichthyology*, 57 (4), 547-552.
6. Mamilov N. & Karimov B. (2020) *Cottus spinulosus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T156726301A156726410.
7. Sheraliyev B., Qayumova Y., Komilova D. Farg'ona vodiysi suv havzalarida uchraydigandog'li yalangbaliq (*Triplophysa strauchi*) ning morfologik xususiyatlari//NamDU, ilmiy, xabarnomasi, II2020, №1, 120–131.
8. Prokofiev A.M. Morphological Classification of Loaches (Nemacheilinae). *Journal of Ichthyology*, 2010. Vol. 50(10), –Р. 827-913.
9. Wu Y.F., Wu C.Z. The Fishes of the Qinghai-Xizang Plateau. – Chengdu: Sichuan Publishing House of Science & Technology, 1992. – 599 pp.
10. Zhu S.Q. The loaches of the Subfamily Nemacheilinae in China (Cypriniformes: Cobitidae). – Nanjing: Jiangsu Science and Technology Publishing House, 1989. – 150 pp.
11. Sheraliev B., Peng Z. *Triplophysa ferganaensis*, a new loach species from Fergana Valley in Central Asia (Teleostei: Nemacheilidae). *Journal of Fish Biology*, 2021. Vol. 99(3), –Р. 807-817.
12. Sheraliev, B., Kayumova, Y., Peng, Z. *Triplophysa daryoae*, a new nemacheilid loach species (Teleostei, Nemacheilidae) from the Syr Darya River basin, Central Asia // Zookeys, 2022. 1125, 47-67.
13. T.Zohidov. Zoologiya ensiklopediyasi.I-tom,1979
14. Николский Г.В. Рыбы Таджикистана. – Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1938. – 228 с.
15. Qayumova Y.Q. O'zbekiston suv havzalarida uchrovchi yalangbaliqlarning endemik urug'i – *Iskandaria* Prokofiev, 2009 (Teleistei: Nemacheilidae) turlari plastik belgilarining solishtirma tahlili // Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 2022. – №9/1, – В. 38-41.
16. Muqimov M.A. Farg'ona vodiysi suv havzalarida tarqalgan *Schizothorax eurystomus*ning morfologik xususiyatlari //Namangan davlat universiteti axborotnomasi,2021. №7/1, – Б. 123-127.
17. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть II. – Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1949. – 467-926 с.
18. Mirzayev U.T. Turkiston laqqachasi // O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi, II jild: Hayvonlar; J.A.Azimov umumiylahri ostida. – Toshkent: Chinor ENK.2019,118-118b(2),149-159.
19. Karimov B. *Glyptosternon oschanini*. The IUCN Red List of Threatened species 2020: e.T169837826A169837859. (<https://www.iucnredlist.org/>)
20. Sheraliyev B.M., Qayumova Y.Q., Ro'zimov A.D., Komilova D.I. Sirdaryo havzasida uchrovchi Oshanin laqqachasi (*Glyptosternon oschanini*) ning morfometrik ko'satkichlariga oid // Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi,2022.–№2.–В.23-27.
21. Никанорова, Александра Дмитриевна. Ландшафтно-геоэкологическое обоснование оптимизации водопользования в орошаемом земледелии Ферганской долины: диссертация кандидата географических наук : 25.00.36 / Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2015. — 169 с.
22. Sheraliev, B., & Peng, Z. *Triplophysa ferganaensis*, a new loach species from Fergana Valley in Central Asia (Teleostei: Nemacheilidae). // *Journal of Fish Biology*, II2021, II№99 (3), 807–817.
23. Thoni R.J., Simonov E., Artaev O., Asylbaeva S., Aibek S.U. & Levin B.A. A century in synonymy: molecular and morphological evidence for the revalidation of *Glyptosternon oschanini* (Herzenstein, 1889) (Actinopterygii:Sisoridae) // Zootaxa. 2017. №4277(3), 435–442.