

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI  
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.  
ILMIY  
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi  
Yilda 6 marta chiqadi

2024/3-SON  
ILLOVA TO'PLAM

**НАУЧНЫЙ  
ВЕСТНИК.  
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года  
Выходит 6 раз в год

## MATEMATIKA

**S.S.Jo'raboyev, M.X.Abdumatalova**

Tengsizliklarni isbotlashda ehtimollar nazariyasi elementlaridan foydalanish metodikasi ..... 13

**Sh.T.Karimov, J.J.Jahongirova**

Teskari masalalarni yechishning chekli ayirmalar sxemasini teskarilash usuli ..... 18

**B.M.Mamadaliev, M.I.Davlatboeva**About geometry on subspaces in  ${}^2R_5$  ..... 22**A.O.Mamanazarov, Y.B.Djuraeva**

The existence of the solution of a boundary value problem for the benjamin, bona and mahony equation including the hilfer fractional differential operator ..... 27

**A.M.Mirzaqulov**

Kompyuterli matematik modellashtirish asoslari ..... 33

**A.O.Mamanazarov, D.R.Ibrohimova**

Vaqt yo'nalishlari turlicha bo'lgan parabolo-giperbolik tenglama uchun chegaraviy masala ..... 38

## FIZIKA-TEXNIKA

**V.R.Rasulov, B.B.Axmedov, I.A.Muminov**

Elektronlarning energiya spektrini Kroning va Penni usuli yordamida hisoblash ..... 43

**M.M.Sobirov, M.M.Kamolova, Q.Q.Muhammadaminov**

Atmosferadagi quyosh nurlanish oqimi maydonini shakllanishiga begona aralashmalarning ta'siri ..... 49

**M.M.Sobirov, J.Y.Roziqov, Q.Q.Muhammadaminov**

Yarim cheksiz o'lchamdag'i kristallarda qutblangan nurlanish oqimini ko'chirilishi ..... 55

**V.R.Rasulov, I.A.Muminov, G.N.Maqsudova**

Xoll effektini brillyuen zonalari nazariyasi yordamida o'rganish ..... 60

**M.M.Sobirov, V.U.Ro'ziboyev**

Yer sirtidan qaytgan quyosh nurlanish oqimini atmosferadagi nurlanish maydoniga ta'siri ..... 64

**G'.R.Raxmatov**

Infragizil quritishning mahsulot sifat kattaliklariga ta'siri ..... 70

**V.U.Ro'ziboyev**

"Bipolar tranzistorlarni ularning kuchaytirish xususiyatlarini o'rganish" laboratoriya ishida arduinodan foydalanish ..... 75

**J.Y.Roziqov**

Quyosh nurlanishining atmosferada yutilishi va sochilishi. Zaiflashish qonuni ..... 82

**O.K.Dehkonova**

Fizika ta'limi jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish orqali innovatsion infratuzilmasini shakllantirish ..... 86

**Q.I.G'aynazarova, T.M.Azimov**

Uchlamchi qotishmalarning istiqbollari ..... 98

**B.U.Omonov**Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> yarimo'tkazgich yupqa pardalarning termoelektrik xususiyatlari ..... 103**K.E.Onarkulov, G.F.Jo'rayeva**

Afk elementlarining tuzilishi va xususiyatlarining bog'lanish o'rganish ..... 109

**З.Хайдаров, Д.Ш.Гуфронова, С.Х.Мухаммадаминов**

Исследование преобразовательных и выходных характеристик системы полупроводник – плазма газового разряда с дополнительным сеточным электродом ... 116

**M.Kholdorov, G.Mamirjonova**

Achievements in the dehydration of fruits and vegetables and the advantages of the methods used ..... 121

**M.Kholdorov, G.Mamirjonova**

Electronic conduction phenomena observed on the surface of semiconductors and metals... 124



УО'К: 519.62:517.95

**TESKARI MASALALARINI YECHISHNING CHEKLI AYIRMALAR SXEMASINI  
TESKARILASH USULI**

**ОБРАТНЫЙ МЕТОД КОНЕЧНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ**

**INVERSE METHOD OF FINITE DIFFERENCE SCHEME FOR SOLVING INVERSE  
PROBLEMS**

**Karimov Shaxobiddin Tuychiboyevich<sup>1</sup>** 

<sup>1</sup>Farg'ona davlat universiteti, amaliy matematika va informatika kafedrasi dotsenti, fizika-matematika fanlari doktori.

**Jahongirova Jayrona Jo'rabek qizi<sup>2</sup>** 

<sup>2</sup>Farg'ona davlat universiteti Magistratura bo'limi "Amaliy matematika (sohalar bo'yicha)" mutaxassisligi magistranti

**Annotatsiya**

*Ushbu maqolada teskari masalalarni yechishning chekli ayirmalar usulidan foydalanish va chekli ayirmalari teskarilash orqali teskari masalani echimini aniqlash jarayoni bayon qilingan.*

**Аннотация**

*В данной статье описан процесс решения обратных задач с использованием метода конечных разностей и обращения конечно-разностных схем.*

**Abstract**

*This article describes the process of solving inverse problems using the finite difference method and inverting finite difference schemes.*

**Kalit so'zlar:** Teskari masala, chekli ayirmalar usuli, nokorrekt masala, Dalamber formulasi

**Ключевые слова:** Обратная задача, конечно-разностный метод, некорректная задача, формула Даламбера

**Key words:** Inverse problem, finite-difference method, ill-posed problem, Dalembert's formula

**KIRISH**

XX asning o'rtalaridan boshlab "teskari qo'yilgan masalalar" atamasi -zamonaviy fanga tez kirib bormoqda. Ellik yildan sal ko'proq vaqt davomida ushbu masalalarni o'rganish natijasida ular klassik matematikaning turli sohalariga tegishli masalalarning muhim qismini (bundan tashqari, eng murakkablari, ularning nokorrektligi va chiziqli bo'limgaganligi sababli) o'z ichiga olishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Boshqa tomondan, teskari va nokorrekt qo'yilgan masalalar fizika, geofizika, tibbiyot, astronomiya va umuman, matematik usullar qo'llaniladigan bilimlarning barcha sohalarida tizimli o'rganish va qo'llash ob'ektiga aylangan. Gap shundaki, teskari masalalar yechimlarida o'rganilayotgan muhitning to'lqin tarqalish zichligi va tezligi, elastiklik parametrlari, o'tkazuvchanlik, dielektrik va magnit o'tkazuvchanlik kabi muhim xossalari, shuningdek, ularning xossalari va bir jinslilarning joylashuvi tavsiflanadi. Bunday ma'lumotlar fiziklar, geofiziklar, shifokorlar va umuman olganda, kirishi juda mashaqqatli yoki xavfli yoki hatto imkonsiz bo'lgan ob'ektlar va hududlarni tadqiqotchilar uchun qanchalik qiziqarli va muhimligini tushunish oson.

Teskari va nokorrekt qo'yilgan masalalar bo'yicha nashrlar XX asning birinchi yarmida paydo bo'ldi. Ular fizika (kvant tarqalishi nazariyasining teskari masalalari), geofizika (elektr razvedkaning teskari masalalari, seysmik, potentsial nazariya), astronomiya va tabiatshunoslikning boshqa sohalarini bilan bog'liq edi. Kuchli superkompyuterlarning paydo bo'lishi bilan teskari va nokorrekt qo'yilgan masalalarni qo'llash sohasi matematik usullar qo'llaniladigan deyarli barcha

## MATEMATIKA

ilmiy sohalarni qamrab oldi. Teskari va nokorrekt qo'yilgan masalalardan foydalanish asosan geofizika (elektrik qidiruv, logistika, seysmik, potentsial nazariyaning teskari masalalari va boshqalar), astronomiya, tibbiyat va fanning boshqa sohalari bilan bog'liq.. Teskari masalalarni hal qilish, shuningdek, qo'shimchalar, nuqsonlar, manbalar (issiqlik, tebranish, stress, ifloslanish) va boshqalarning joylashishini, shakli va tuzilishini aniqlashga yordam beradi. Bunday keng qo'llanilishi bilan teskari va nokorrekt qo'yilgan masalalar nazariyasi o'zining paydo bo'lishidan boshlab zamonaviy fanning eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylangani ajablanarli emas.

### ADABIYOTLAR TAHLLILI VA METODOLOGIYA

Nokorrekt va teskari masalalar yo'nalishining asoschilaridan A.N.Tixonovning [1], M.M.Lavrent'evning [2] ishlarida (korrektlik, turg'unlik, regulyarizasiya oilasi, kvaziyechim, evolyutsion tenglamalar uchun Koshi masalasi) ma'lumotlar to'liq yoritib berilgan. Nokorrekt qo'yilgan masalalarni sonli yechish nazariyasi A.N.Tixonov [3] regulyarizatsilash algoritmi tushunchasini shakllantirgandan keyingina hisoblash matematikasining mustaqil bo'limi sifatida shakllandi.

Giperbolik tenglamalar uchun teskari koeffitsientli masalalar nazariyasini ishlab chiqishda I.M.Gelfand va B.M.Levitanlarning ishlari matematik asos bo'lib xizmat qildi. Giperbolik tenglamalar uchun teskari masalalarda bir qancha nazariy natijalar olingan va ularni yechishning turli usullari ishlab chiqilgan. S.I.Kabanixin [4] giperbolik tenglamalar koeffitsientlarini aniqlash uchun proyeksiya-farg' usullarini taklif qildi. S.I.Kabanixinning [5] monografiyasida taqsimlangan dastlabki ma'lumotlar bilan to'g'ri va teskari masalalarni o'rganish natijalari, giperbolik tipdag'i tenglama uchun yig'ma manbali masala berilgan. Giperbolik tipdag'i tenglama uchun teskari masalaning umumiyligi yechilishi isbotlangan.

### NATIJA VA MUHOKAMA

#### Teskari masalalarni yechishning chekli ayrimalar sxemasini teskarilash usuli

Teskari masalalarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, ularning ikkita turi mavjud bo'lib (retrospektiv va chegara) chiziqli, ikkinchisi (koeffitsiyent va geometrik) sezilarli darajada chiziqli emas. Masalalarning nochiziqliligi tufayli ularni yechish ancha murakkab bo'lib, buning uchun chekli ayirmalar usulini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Ushbu usulning asosiy g'oyasi chekli ayrimalar operatori yordamida differensial operatorni yaqinlashtirish va bosqichma-bosqich tugun qiymatlarini topishdir. Har xil turdag'i operatorlar uchun chekli ayirmalar sxemasini teskarilash usuli hozirda yetarlicha batafsil ishlab chiqilgan, ammo u quyidagi xususiyatga ega: chekli ayirmalar operatorining o'lchami oshgani sayin, yechim topish jarayoni turg'un bo'lmay qoladi, bu teskari masalani nikkorektligini keltirib chiqaradi. Nokorrekt qo'yilgan masalaning oldingi tahlili (xususan, raqamlı farqlash protseduralari) chekli ayirmalar sxemasining qadami kiritilgan ma'lumotlarning xatosiga mos kelishi kerakligini ko'rsatadi. Keling, ushbu yondashuvning asosiy bosqichlarini misol sifatida quyidagi masaladan foydalanib ko'rib chiqaylik:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + q(x)v, \quad (x, t) \in \Delta_1(T), \\ v|_{x=0} &= g(t), \quad \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad t \in (0, T). \end{aligned} \tag{1}$$

Ushbu (1) masala "yetarlicha kichik sohada", shuningdek, har qanday  $T \in R_+$  uchun ham korrekt. Faraz qilaylik  $q \in C^4[0, T]$  (bundan keyin shunday  $q$  deb hisoblaymiz  $q$  silliqlikni saqlagan holda bir tekisda  $R_-$  ga davom ettirilishi mumkin). Buni  $\Delta_1(T) = \{(z, t) \in R^2 : t \in (0, T), z \in (-T+t, T-t)\}$  da  $q \in C^4(\overline{\Delta_1(T)})$  uchun ko'rsatish osон, Ixtiyoriy natural  $N$  son va  $h = T/N$  qadamni olamiz. Quyidagi belgilashlarni kiritamiz :  $v_i^k = v(ih, kh)$ ,  $q_i = q_i(hi)$ ,  $g^k = g(hk)$ .

Keyin (1) masalani differensiallash operatorlarini chekli ayrimalar analoglar bo'yicha yaqinlashtirib, diskret formulada yozish mumkin:

$$h^{-2} (v_i^{k+1} - 2v_i^k + v_i^{k-1}) = h^{-2} (v_i^k - 2v_i^k + v_{i-1}^k) + q_i v_i^k + O(h^2), \quad (2)$$

$$v_i^0 = q_i, \quad (3)$$

$$v_0^k = g^k, \quad (4)$$

$$v_1^k = \frac{1}{2} (g^{k+1} + g^{k-1}) + O(h^2). \quad (5)$$

(2) dan olamiz

$$v_{i+1}^k = v_i^{k+1} + v_i^{k-1} - v_{i-1}^k - h^2 q_i v_i^k + h^2 O(h^2) \quad (6)$$

Tengliklar zanjirini (6) ga almashtiramiz.

$$v_i^{k+1} = v_{i-1}^{k+2} + v_{i-1}^k - v_{i-2}^{k+1} - h^2 q_{i-1} v_{i-1}^{k+1} + h^2 O(h^2),$$

$$v_{i-1}^{k+2} = v_{i-2}^{k+3} + v_{i-2}^{k+1} - v_{i-3}^{k+2} - h^2 q_{i-2} v_{i-2}^{k+2} + h^2 O(h^2)$$

va hokazo, natijada, ba'zi o'zgarishlardan keyin biz quyidagi formulani olamiz

$$v_{i+1}^k = v_i^{k-1} + \frac{1}{2} (g^{k+1} - g^{k-1}) - h^2 \sum_{j=1}^i q_j v_j^{k+1-j} - \frac{1}{2} h^2 q_0 g^{k+1} + O(h^2). \quad (7)$$

O'z navbatida,  $v_i^{k-1}$  qiymat (7) va hokazo formuladan foydalangan holda oldingi qatlamlardagi qiymatlar orqali ifodalanishi mumkin. (7) ketma-ket almashtirishni qo'llash orqali biz nihoyat quyidagi tasvirni olamiz:

$$v_{i+1}^k = \frac{1}{2} (g^{k+i+1} + g^{k-i-1}) - \frac{1}{2} h^2 \sum_{j=0}^i q_0 g^{k+i-2j} - h^2 \sum_{s=1}^i \sum_{j=1}^s q_j v_j^{k-i+j+2s} + O(h^2). \quad (8)$$

(8) tenglik quyidagi Dalamber formulasining diskret analogidir [6]:

$$v(x, t) = \frac{1}{2} [g(t+x) + g(t-x)] - \frac{1}{2} \int_0^x \int_{t-x+\xi}^{t+x-\xi} q(\xi) v(\xi, \tau) d\tau d\xi \quad (9)$$

(8) formula teskari masalani tahlil qilish imkonini beradi. (8) da  $k=0$  deylik,  $q$  ning  $R_-$  dagi juft davomidan foydalanim quyidagi formulaga ega bo'lamic:

$$q_{i+1} = g^{i+1} - \frac{1}{2} h^2 \sum_{j=0}^i q_0 g^{i-2j} - h^2 \sum_{s=1}^i \sum_{j=1}^s q_j v_j^{2s-i-j} + O(h^2). \quad (10)$$

Shunday qilib  $q$  funksiya uchun operator tenglamasining ayirmali analogiga ega bo'lamic:

$$q(t) = g(t) - \int_0^x \int_0^{\xi} q(\xi) v(\xi, \tau) d\tau d\xi \quad (11)$$

Aytaylik  $T \in R_+$  uchun  $\Delta_2(T)$  to'plamni quyidagicha

aniqlansin:  $\Delta_2(T) = \{(x, t) : x \in (0, T), t \in (x-T, T-x)\}.$

$\Delta_2^h(T)$  ni  $(ih, kh) \in \Delta_2(T)$  bo'ladigan butun sonlarning  $(i, k)$  juftliklari sifatida to'plamni aniqlaylik. (2) - (5) yaqinlashishlar asosida teskari masalani chekli ayirmasini tuzamiz:

$$u_{i+1}^k = u_i^{k+1} + u_i^{k-1} - u_{i-1}^k - h^2 p_i u_i^k,$$

$$i = \overline{2, N}; (i, k) \in \Delta_2^h(T)$$

$$u_i^0 = p_i, \quad i = \overline{0, N};$$

$$u_1^k = \frac{1}{2} (g^{k+1} + g^{k-1}), \quad k = \overline{-N+1, N-1},$$

bu yerda  $i = \overline{N_1, N_2}$  ifoda  $i$  ning  $N_1$  dan  $N_2$  gacha bo'lgan barcha butun qiymatlarni qabul qilishni bildiradi.

(11) - (13) ayirmali teskari masala yechimi munosabatlarini qanoatlantriradigan  $(p_i, u_i^k), (i, k) \in \Delta_2^h(T)$  juft to'r funksiyalaridir.

**MATEMATIKA**

Quyidagi teorema o'rini:

**1-teorema**

(11)-(13) ayirmali teskari masala har qanday  $T \in R_+$  va har qanday  $N > 2$  uchun yagona yechimiga ega.

Chekli ayirmani yaqinlashtirishga asoslangan yondashuvga asoslanib, kerakli funksiyaning barcha tugun qiymatlarini aniqlash mumkin.

**ADABIYOTLAR RO'YXATI**

1. Тихонов А.Н. Теоремы единственности для уравнения теплопроводности //Матем. сб. 1935. Т.42. №2. С. 199-211.
2. Лаврентьев М.М. Условно – корректные задачи для дифференциальных уравнение. Новосибирск. НГУ 1973.
3. Тихонов А.Н. Математическая геофизика. - М.: ОИФЗ РАН, 1999.- 476 с.
4. Кабанихин С.И. Проекционно-разностные методы определения коэффициента гиперболических уравнений. - Новосибирск: Наука, 1988.- 168 с.
5. Кабанихин С.И. Обратные и некорректные задачи. – Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2009. - 457 с.
6. Ватульян А. О. Математические модели и обратные задачи // Соросовский Образовательный Журнал. 1998. № 11. – С. 143–148.