

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

2024/3-SON
ILLOVA TO'PLAM

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Sh.K.Yakubova	
Methodological and didactic requirements for demonstration experiments in secondary school	130
Д.А.Юсупова	
Влияние деформации и введения примесей на уровень ферми и плотность эффективного поверхностного заряда в пленках теллуридов висмута-сурымы	134
F.K.Yusupova	
Turdosh fanlar integratsiyasini takomillashtirishda picrat modelini qo'llash.....	140
A.A.Yuldashev	
Sifatli optronlar yaratish.....	144
Sh.A.Yuldashev, S.M.Zaynolobidinova	
Ikkilamchi issiqlikni yorug'likga aylantiruvchi optoelektron qurilma	149
E.A.Ergashev	
Biologik suyuqliklarning suvsizlanishida yuzaga kelgan fatsiyalarning xususiyatlarini baholash	154

KIMYO

M.Y.Ismoilov, Sh.V.Inobiddinova	
Peganum harmala o'simligini makro va mikroelementlari.....	158
M.Y.Ismoilov	
Tog' minerallari tarkibini tadqiq qilish.....	163
M.Y.Ismoilov	
Farg'ona vodiysi tog' minerallari tarkibini tadqiq qilish	170
M.T.Kurbanova, G.I.Qoraboyeva, D.U.Mamaraimova, I.J.Jalolov	
Xanthoparmelia conspersa va Xanthoria elegans lishayniklarining flavonoid tarkibini tadqiq etish	173
G.I.Qoraboyeva, M.T.Kurbanova, I.J.Jalolov	
Dermatocarpon miniatum va Lecanora argopholis lishayniklarining flavonoid tarkibini tadqiq etish	176
S.A.Karimova, M.Y.Imomova	
Rubus idaeus L. (Malina) va Rubus caesius L. (Ko'kimir maymunjon) o'simliklari tarkibidagi vitaminlar miqdorini aniqlash.....	180
J.I.Tursunov, A.A.Ibragimov	
Aconitum septentrionale Koelle o'simlididan β -sitosterin ajratib olish	186
R.M.Nazirtashova, Sh.M.Qirg'izov, J.I.Tursunov	
Cucumis sativus o'simligi poya va barg qismini antioksidantlik xususiyatini o'rganish	189
T.Sh.Amirova, M.O.Rasulova, G.A.Umarova	
Qoramol, qo'y va echki terisining IQ spektrlari tahlili	193
T.Sh.Amirova, Sh.Sh.Shermatova	
O'simliklardan bo'yoq olish va ularni IQ spektrini o'rganish	197
O.M.Nazarov, T.Sh.Amirova, S.R.Komilova	
Matolarining rang mustahkamligi, terga chidamligi va rangini ishqalanishga chidamligini aniqlash.....	204
T.Sh.Amirova, Z.B.Xoliqova	
Ipak matolarining IQ spektri tahlili	208
O.A.Abduhamedova, O.M.Nazarov	
Yerqalampir o'simligining kimyoviy tarkibi va xalq tabobatida qo'llanilish usullari	213
I.R.Asqarov, M.A.Xolmatova	
Ravoch (<i>Rheum</i>) va Jusay (<i>Allium odorum</i>) o'simliklari aralashmasi asosida olingan "AS RHEUM" oziq-ovqat qo'shimchasining suvda eruvchi vitaminlar tahlili	216
X.N.Saminov, O.M.Nazarov, Q.M.Sherg'oziyev	
<i>Punica granatum</i> L. o'simligining aminokislota tarkibini o'rganish.....	219
О.М.Назаров, Х.Н.Саминов	
Биологическая активность растений рода <i>Nitraria</i>	224
M.A.Axmadaliyev, N.M.Yakubova	
Turli o'simliklar asosida furfurol olish.....	228



УО'К: 543.544.577.16

**CUCUMIS SATIVUS O'SIMLIGI POYA VA BARG QISMINI ANTIOKSIDANTLIK
XUSUSIYATINI O'RGANISH**

**ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ СТЕБЛЕВОЙ И ЛИСТОВОЙ ЧАСТИ
РАСТЕНИЯ CUCUMIS SATIVUS**

**STUDYING THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF THE STEM AND LEAF PART OF THE
PLANT CUCUMIS SATIVUS**

Nazirtashova Roziya Mamadalievna¹

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyat instituti, "Tibbiy va biologik kimyo" kafedrası assistenti

Qirg'izov Shaxabiddin Mirzaramovich² 

²Andijon davlat universiteti, k.f.d.professor

Tursunov Jaxongir Isroilovich³ 

³Farg'ona davlat universiteti, k.f.b.f.d.(PhD)

Annotatsiya

Ushbu maqolada Cucumis sativis o'simligini poya va barg qismi aralashmasidan tayyorlangan kukun holdagi namunanining biologik faolligi – antioksidantlik xususiyati o'rganish usuli yoritilgan. Cucumis sativis namunasida adrenalining in vitro sharoitida autoksidlanish reaksiyasini ingibirlanishi metodi bilan ya'ni adrenalining autoksidlanish reaksiyasini ingibirlash qobiliyati va shu bilan birga kislородning faol shaklini (KFSH) hoslil bo'lishini oldini olishi bilan baholandi.

Аннотация

В этой статье описан метод изучения биологической активности - антиоксидантных свойств образца порошка растения Cucumis sativis, приготовленного из смеси частей стебля и листьев. В образце Cucumis sativis адреналин оценивали методом ингибиования реакции автоокисления in vitro, то есть способность адреналина ингибировать реакцию аутоокисления и одновременно предотвращать образование активных форм кислорода (АФК).

Abstract

This article describes a method for studying the biological activity - antioxidant properties of a sample of Cucumis sativis plant powder prepared from a mixture of stem and leaf parts. In the Cucumis sativis sample, epinephrine was assessed by the in vitro autooxidation reaction inhibition method, that is, the ability of epinephrine to inhibit the autooxidation reaction and simultaneously prevent the formation of active oxygen forms (AOF).

Kalit so'zlar: Cucumis sativis, antioksidantlik, kislородning faol shakli (KFSH), adrenalin, in vitro, spektrofotometr. antioksidant faoliyoti.

Ключевые слова: Cucumis sativis, антиоксидант, активная форма кислорода (АФК), адреналин, in vitro, спектрофотометр. антиоксидантная активность.

Key words: Cucumis sativis, antioxidant, active oxygen form (AOF), adrenaline, in vitro, spectrophotometer. antioxidant activity.

KIRISH

Insoniyat paydo bo`libtiki o'z hayoti faoliyati davomida o'zi yashayotgan atrof muhitga, voqealarda hodisalarga turlicha usullarda munosabatlarini bildirib kelmoqda. Ajdodlarimiz qadim zamonalardanoq o'z maqsadlari va ehtiyojlariga qarab oziq - ovqat, kiyim kechak, dori-darmon tayyorlashda tabiiy manbalardan keng foydalanganlar.O'z hayot tajribalari asosida o'simliklarning xossa va xususiyatlari, qanday kasalliklarga davo bo'lishi haqida ma'lumotlar to'plagan va keyingi avlodlarga yetkazish maqsadida asar holiga keltirganlar bunday asarlarga misol qilib Abu Ali ibn

Sinoning "Tib qonunlari", "Shifobaxsh o'simliklar haqida" risolalari va bir qancha asarlarini misol qilish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Adabiyotlarda *Cucumis sativus* meva qismining mikro va makroelementlar, flavonoidlar, alkaloidlar, vitaminlar, efir moylari va biologik faolligi o'rganilgan, o'simlikning bargi va poya qismlarining kimyoviy tarkibi va antioksidantlik haqidagi ma'lumotlar adabiyotlarda yetarlicha emas [1]. Oldingi tajribalarimizda *Cucumis sativus* o'simligining barg va poya qismlaridagi flavonoidlar va suvda eruvchan vitaminlarning tarkibi va miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) yordamida o'rganilgan, gall kislota, rutin va suvda eriydigan B1, C, B6, B9, B2, B12 va PP vitaminlari miqdori aniqlangan va adabiyot ma'lumotlari bilan taqqoslangan [2]. Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarda o'simliklarda keng tarqalgan flavonoidlar yuqori antioksidant faoliyka ega [3]. Turli tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, antioksidant birikmalar erkin radikallarni zararsizlantirish orqali saratonga qarshi juda muhim ta'sirga ega.

O'simlik haqida oddiy bodring yoki bodring (lat. *Cucumis sativus*) — bir yillik o't o'simligi, sabzavot o'simligining qovoqdoshlar oilasiga mansub bodring (*Cucumis*) turi (*Cucurbitaceae*). Poyasi 100-250 sm uzunlikda, shoxlangan, o'rmalovchi yoki ko'tarilgan oddiy novdalar yordamida, junli – o'rmalovchi, dag'al, paychalari bilan tugaydigan, ular bilan tayanchga yopishib, 1-2 m cho'zilgan o'simlik tayanchlari bo'lmasa, yerga ham tarqalishi mumkin. Barglari yuraksimon, besh bo'lakli. Mevasi ko'p urug'li, suvli, zumrad yashil, zich, o'tkir, tabiiy muhitda ham mayda tikanli (silliq ekstrakarpli (po'sti) mevalar sun'iy ravishda yetishtirilgan). Mevaning tuzilishi Qovoq oilasiga xos bo'lib, botanika adabiyotida qovoq deb ta'riflangan. U har xil shakl va o'lchamlarga ega bo'lishi mumkin (xilma-xilligiga qarab).[4]

Analiz uchun olingan *Cucumis sativus* o'simligining barg va poya qismlari aralashmasining kukun holdagi namunalari adrenalinning *in vitro* sharoitida autoksidlanish reaksiyasini ingibirlanishi metodi bilan ya'ni adrenalinning autooksidlanish reaksiyasini ingibirlash qobiliyati va shu bilan birga kislorodning faol shaklini (KFSh) hosil bo'lishini oldini olishi bilan baholanadi. Tekshirilgan namunalarning antioksidant faolligi adrenalinning autooksidlanishini ingibirlashi bo'yicha foizlarda (AF%) ifodalandi.

Namuna ekstraktini tayyorlash 0,75 g *Cucumis sativus* o'simligi namunasini 50 ml suvda 10 daqiqa qaynatish bilan amalga oshirildi. Olingan ekstrakt 0,45 mkm li shpritsli filtrdan o'tkazilib, analiz uchun foydalanildi.

Buning uchun 0,2 M karbonatli (Na_2CO_3 - NaHCO_3 , pH=10,65) buferdan 3 ml hamda adrenalinin tartratning 0,18 % eritmasidan 0,15 ml solib, tez aralashtirib, qalinligi 10 mm bo'lgan kyuvetada K7000 (YOKO, Xitoy) spektrofotometrda 10 daqiqa davomida har 30 sekundda 347 nm to'lqin uzunligida optik zichligi D_1 aniqlandi.

Tekshirilayotgan o'simlik ekstraktidan 0,045 ml, bufer eritmadan 3 ml va adrenalinin tartratning 0,18 % li eritmasidan 0,15 ml olib yuqoridagi usulda aralashtirildi hamda 347 nm to'lqin uzunligida optik zichligi o'lchandi (D_2).

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Cucumis sativus o'simligining barg va poya qismlari aralashmasining antioksidantlik xususiyatini natijalari 1 va 2-jadval hamda 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-jadval

Adrenalin va namunaning o'lchangan optik zichliklari

Vaqt, sek	Adrenalin D_1	<i>Cucumis sativus</i> o'simligining barg va poya qismlari aralashmasi (D_2)
0	0,082	0,081
30	0,153	0,161
60	0,22	0,231
90	0,272	0,290
120	0,312	0,339
150	0,35	0,379
180	0,382	0,409
210	0,409	0,434
240	0,433	0,449
270	0,452	0,462


KIMYO

300	0,468	0,471
330	0,48	0,479
360	0,49	0,484
390	0,498	0,488
420	0,504	0,490
450	0,508	0,492
480	0,512	0,494
510	0,515	0,495
540	0,517	0,497
570	0,518	0,498
600	0,52	0,498

Tekshirilgan namunalarning antioksidant faolligi adrenalining autooksidlanishini ingibirlashi bo'yicha foizlarda (AF%) ifodalanadi va quyidagi formula bilan hisoblandi:

$$AF = \frac{(D_1 - D_2) \cdot 100}{D_1}$$

Bu yerda, D_1 -buferga qo'shilgan adrenalin tartrat eritmasinig optik zichligi, D_2 -buferga qo'shilgan namuna ekstrakti va adrenalin tartratni optik zichligi.



1-rasm. Adrenalin va namunalar qo'shilgan adrenalinning optik zichliklari o'sish diagrammasi ($\lambda=347$ nm).

2-jadval

Antioksidant faolligi aniqlangan o'simlikni suvli ekstraklarini vaqt davomida KFSh ni ingibirlanishi

Tekshirilayotgan ekstrakt	AF, %
	Cucumis sativus o'simligining barg va poya qismlari aralashmasi
1-minut	-5,00
3-minut	-7,07
5-minut	-0,64
10-minut	4,23
O'rtacha	-2,12

XULOSA

Olingan natijalar *Cucumis sativus* o'simligining barg va poya qismlari aralashmasining kislородning faol shaklini ingibirlash qobiliyatি birinchi marta o'rganildi va (o'rtacha antioksidant faollik -2.12) ekanligini ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oragwu, Ifeoma & Okolo, Azubuike & Emmanuel, Ifeanyi & Osuagwu, & C., Collins & E., Onyia & A., Usiakpebru & Okechukwu, James. (2021). Phytochemical and Proximate Composition of Cucumber (*Cucumis Sativus*) Seed Oil. International Journal of Research and Scientific Innovation. 08. 244-250. 10.51244/IJRSI.2021.8207.
2. Назирташова Р.М., Киргизов Ш.М., Турсунов Ж.И. Определение водорастворимого витаминного состава и количества флавоноидов в листовой части растения *Cucumis Sativus*, произрастающего в Ферганской долине // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2024. 6(120). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/17673> (дата обращения: 31.05.2024).
3. *Hepatopathy of unknown etiology – is liver biopsy a good tool in differential diagnosis?* Jabłońska J., Cielecka-Kuszyk J., Mikuła T., Kozłowska J., Wiercińska-Drapała A. 2019, Arch Med Sci , Vol. 15, pp. 1462-1467.
- 4.Флора Узбекистана, Том –V, Издательство академии наук Узбекской ССР. Ташкент -1961, стр-608