


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI  
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.  
ILMIY  
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi  
Yilda 6 marta chiqadi



**2024/3-SON  
ILLOVA TO'PLAM**

**НАУЧНЫЙ  
ВЕСТНИК.  
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года  
Выходит 6 раз в год

<b>Sh.K.Yakubova</b>	
Methodological and didactic requirements for demonstration experiments in secondary school .....	130
<b>Д.А.Юсупова</b>	
Влияние деформации и введения примесей на уровень ферми и плотность эффективного поверхностного заряда в пленках теллуридов висмута-сурымы .....	134
<b>F.K.Yusupova</b>	
Turdosh fanlar integratsiyasini takomillashtirishda picrat modelini qo'llash.....	140
<b>A.A.Yuldashev</b>	
Sifatli optronlar yaratish.....	144
<b>Sh.A.Yuldashev, S.M.Zaynolobidinova</b>	
Ikkilamchi issiqlikni yorug'likga aylantiruvchi optoelektron qurilma .....	149
<b>E.A.Ergashev</b>	
Biologik suyuqliklarning suvsizlanishida yuzaga kelgan fatsiyalarning xususiyatlarini baholash .....	154

---

KIMYO

<b>M.Y.Ismoilov, Sh.V.Inobiddinova</b>	
Peganum harmala o'simligini makro va mikroelementlari.....	158
<b>M.Y.Ismoilov</b>	
Tog' minerallari tarkibini tadqiq qilish.....	163
<b>M.Y.Ismoilov</b>	
Farg'ona vodiysi tog' minerallari tarkibini tadqiq qilish .....	170
<b>M.T.Kurbanova, G.I.Qoraboyeva, D.U.Mamaraimova, I.J.Jalolov</b>	
Xanthoparmelia conspersa va Xanthoria elegans lishayniklarining flavonoid tarkibini tadqiq etish .....	173
<b>G.I.Qoraboyeva, M.T.Kurbanova, I.J.Jalolov</b>	
Dermatocarpon miniatum va Lecanora argopholis lishayniklarining flavonoid tarkibini tadqiq etish .....	176
<b>S.A.Karimova, M.Y.Imomova</b>	
Rubus idaeus L. (Malina) va Rubus caesius L. (Ko'kimir maymunjon) o'simliklari tarkibidagi vitaminlar miqdorini aniqlash.....	180
<b>J.I.Tursunov, A.A.Ibragimov</b>	
Aconitum septentrionale Koelle o'simlididan $\beta$ -sitosterin ajratib olish .....	186
<b>R.M.Nazirtashova, Sh.M.Qirg'izov, J.I.Tursunov</b>	
Cucumis sativus o'simligi poya va barg qismini antioksidantlik xususiyatini o'rganish .....	189
<b>T.Sh.Amirova, M.O.Rasulova, G.A.Umarova</b>	
Qoramol, qo'y va echki terisining IQ spektrlari tahlili .....	193
<b>T.Sh.Amirova, Sh.Sh.Shermatova</b>	
O'simliklardan bo'yoq olish va ularni IQ spektrini o'rganish .....	197
<b>O.M.Nazarov, T.Sh.Amirova, S.R.Komilova</b>	
Matolarining rang mustahkamligi, terga chidamligi va rangini ishqalanishga chidamligini aniqlash.....	204
<b>T.Sh.Amirova, Z.B.Xoliqova</b>	
Ipak matolarining IQ spektri tahlili .....	208
<b>O.A.Abduhamedova, O.M.Nazarov</b>	
Yerqalampir o'simligining kimyoviy tarkibi va xalq tabobatida qo'llanilish usullari .....	213
<b>I.R.Asqarov, M.A.Xolmatova</b>	
Ravoch ( <i>Rheum</i> ) va Jusay ( <i>Allium odorum</i> ) o'simliklari aralashmasi asosida olingan "AS RHEUM" oziq-ovqat qo'shimchasining suvda eruvchi vitaminlar tahlili .....	216
<b>X.N.Saminov, O.M.Nazarov, Q.M.Sherg'oziyev</b>	
<i>Punica granatum</i> L. o'simligining aminokislota tarkibini o'rganish.....	219
<b>О.М.Назаров, Х.Н.Саминов</b>	
Биологическая активность растений рода <i>Nitraria</i> .....	224
<b>M.A.Axmadaliyev, N.M.Yakubova</b>	
Turli o'simliklar asosida furfurol olish.....	228



УО'К: 677.6:543.42

**IPAK MATOLARINING IQ SPEKTRI TAHLILI****ИК-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ****IR SPECTRAL ANALYSIS OF SILK FABRICS****Amirova Toyiraxon Sheraliyevna<sup>1</sup> **<sup>1</sup>Farg'ona davlat universiteti, kimyo kafedrasi dotsent, (PhD)**Xoliqova Zoxidaxon Baxromjon qizi<sup>2</sup> **<sup>2</sup>Farg'ona davlat universiteti kimyo kafedrasi talabasi**Annotatsiya**

*Har xil turdagи ipaklarning IQ spektrlariдagi 1400-800 см<sup>-1</sup> oralig'iдagi yutilishini tahlil qilinsa 1015 см<sup>-1</sup> dagi Gly-Gly, 970 см<sup>-1</sup> dagi Ala-Ala hamda 998 va 975 см<sup>-1</sup> dagi yutilishlar Ala-Gly bog'lanishlari uchun belgilanadi. Shuningdek, IQ spektri deformatsion tebranishlari -OH va C-O-C guruhining valent tebranishlari ko'rindi. Adabiyotlarga solishtirildi va taxsil qilindi.*

**Аннотация**

*Анализируя поглощение различных видов шелка в диапазоне 1400-800 см<sup>-1</sup> в ИК-спектрах, Gly-Gly при 1015 см<sup>-1</sup>, Ala-Ala при 970 см<sup>-1</sup> и поглощения при 998 и 975 см<sup>-1</sup> составляют Облигации Ala-Gly определены для. Также из деформационных колебаний ИК спектра были видны -OH и валентные колебания группы С-O-C. Литературу сравнивали и анализировали.*

**Abstract**

*By analyzing the absorption of different types of silk in the range of 1400–800 cm<sup>-1</sup> in the IR spectra, Gly-Gly at 1015 cm<sup>-1</sup>, Ala-Ala at 970 cm<sup>-1</sup> and absorptions at 998 and 975 cm<sup>-1</sup> constitute the Ala-Gly bonds determined For. Also, from the bending vibrations of the IR spectrum, -OH and stretching vibrations of the C-O-C group were visible. The literature was compared and analyzed.*

**Kalit so'zlar:** IQ spektri, deformatsion tebranishlari ( $\text{NH}_2$ ), karbonil guru, valent tebranishlari (CO).**Ключевые слова:** ИК спектр, деформационные колебания ( $\text{NH}_2$ ), карбонильная группа, валентные колебания (CO).**Key words:** IR spectrum, bending vibrations ( $\text{NH}_2$ ), carbonyl group, stretching vibrations (CO).**KIRISH**


Dunyoda ipak ishlab chiqarish yiliga taxminan 1 000 000 tonnani tashkil etadi. Ipakka bo'lgan talab esa har yili o'rtacha 5% ga oshib bormoqda. Aholi sonining ko'payishi va rivojlangan mamlakatlarda tez o'zgarib turadigan kiyim dizaynlari tufayli moda kiyimlariga bo'lgan talabning ortishi bilan ipakka bo'lgan talab yanada ortishi muqarrardir [1]. Ipak ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun yuqori mahsuldar tut navlari hamda iqlim sharoitiga va kasalliklarga chidamli ipak qurti avlodlari yaratish yo'lga qo'yilgan bo'lsada, butun insoniyatni ehtiyojini qondira olmaydi. Shuning uchun ipak sanoati chiqindilarini qayta ishlash asosida ekologik toza, zararsiz, tabiiy ipak matolarini ishlab chiqish va amaliyotga jalg etish muhim ahamiyat kasb etadi.

**ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA**

Jahonda tut ipak qurti pillasi va uni ipak tolasi olish, olingan ipak tolalaridan turli ipak matolarni ishlab chiqish va ularning turli xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Spektral xususiyatlarini tavsiflash; ipak tolalarning asosiy xususiyatlari va parametrlarini aniqlash; tut ipak qurti pillasidan olingan ipak tolalaridan tabiiy adres matolarni ishlab chiqish va kimyoviy tarkibi asosida yangi tovar kodlarini ishlab chiqish, ularni tavsiflash va izohlar tayyorlash hamda amaliyotga joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.


## NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adras matosidan olingan oqsillarning IQ spektrlarini tahlil qilganda, papayadan olingan proteinaza kompleksi bilan gidroliz qilish peptid bog'lanishining parchalanishiga yordam beradi, peptid bog'lanishining aminokarbonil guruhlarining deformasion tebranishlari tufayli ipak uchun 1 (Amid 1 tasmasi) 1656.02 sm<sup>-1</sup> hamda jun uchun 1569.25 sm<sup>-1</sup> da yutilish tasmasining intensivligining pasayishi bilan ifodalanadi [2]. Adras matosi uchun tegishli 1656.02 sm<sup>-1</sup>, 1532.02 sm<sup>-1</sup> va 1244.75 sm<sup>-1</sup> dagi yutilishlar tegishli ravishda Amid I, Amid II va Amid III chiziqlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, aminokislotalarning deformasion tebranishlari (-NH<sub>2</sub>) va karbonil guruhining valent tebranishlari (-CO) tufayli ipak uchun 1532.64 va jun uchun 1418.23 sm<sup>-1</sup> yutilish chiziqlar intensivligining pasayishi namoyon bo'ladi. Ipak matosi tarkibi asosan oqsil moddadan tashkil topgan bo'lib, 100 % toza ipakdan olingan matoning IQ spektridan oqsillarga xos bo'lgan yutilishlarni ko'rish mumkin. Bular 3277.47 sm<sup>-1</sup> sohada -N-H bog'iga, 1619.33 sm<sup>-1</sup> sohada S=O bog'iga hamda 1510.03 sm<sup>-1</sup> sohada amid bog'iga tegishli yutilishlarni ko'rish mumkin. Bu natijalar adabiyot ma'lumotlariga mos keladi [3].




### 1-rasm. Ipak oqsilining IQ spektri

Gaz matosining tarkibi asosan oqsil moddadan tashkil topgan bo'lib matoning IQ spektridan oqsillarga xos bo'lgan yutilishlarni ko'rish mumkin bo'lib, bunda toza ipak matosining IQ spektridagi mavjud yutilishlardan biroz siljiganligi yaqqol namoyon bo'ladi [4]. Bular 3275.01 sm<sup>-1</sup> (ipak matoda 3275.01 sm<sup>-1</sup>) sohada -N-H bog'iga, 1617.75 sm<sup>-1</sup> (ipak matoda 1619.33 sm<sup>-1</sup>) sohada S=O bog'iga hamda 1516.36 sm<sup>-1</sup> (ipak matoda 1510.03sm<sup>-1</sup>) sohada amid bog'iga tegishli yutilishlarni ko'rish mumkin. Bu natijalar adabiyot ma'lumotlariga mos keladi.



**2-rasm. Ipak matoning IQ spektri**




**3-rasm. Gaz matosining IQ spektri**


Beqasam matosining tarkibi ham asosan oqsil moddadan tashkil topgan bo'lib, matoning IQ spektridan oqsillarga xos bo'lgan yutilishlarni ko'rish mumkin. Bunda toza ipak matosining IQ spektridagi mavjud yutilishlardan biroz siljiganligi hamda yutilish intensivliklarining kamayganlini ko'rish mumkin [5]. Bular  $3278.08 \text{ sm}^{-1}$  (ipak matoda  $3275.01 \text{ sm}^{-1}$ ) sohada -N-H bog'iga,  $1617.62 \text{ sm}^{-1}$  (ipak matoda  $1619.33 \text{ sm}^{-1}$ ) sohada S-O bog'iga hamda  $1516.35 \text{ sm}^{-1}$  (ipak matoda  $1510.03 \text{ sm}^{-1}$ ) sohada amid bog'iga tegishli yutilishlarni ko'rish mumkin. Bu natijalar adabiyot ma'lumotlariga mos


## KIMYO

keladi.

**4-rasm. Beqasam matosining IQ spektri**

Adabiyotlardan ma'lumki, adres matosining tarkibi asosan ipak va paxta tolalaridan tashkil topgan. Paxta tolasining tarkibi syellyulozadan tashkil topganligi uchun ipak tolasining IQ spektrida kuzatilmaydigan yangi yutilishlarni ko'rish mumkin [6]. Bular  $3286.00\text{ sm}^{-1}$  sohada -OH bog'iga,  $1160.92\text{ sm}^{-1}$  va  $1104.88\text{ sm}^{-1}$  sohalarda piranoza halqasiga tegishli,  $1053.73\text{ sm}^{-1}$  va  $1029.57\text{ sm}^{-1}$  sohalarda S-O-S ko'prigiga tegishli bo'lgan yutilishlarning yaqqol namoyon bo'lganlini ko'rish mumkin. Bu natijalar adabiyot ma'lumotlariga mos keladi.

**5-rasm. Adras matoning IQ spektri**



### 6-rasm. Atlas matoning IQ spektri

Adabiyotlardan ma'lumki, atlas matosining tarkibi asosan paxta tolsi, viskoza, poliefir va asetat tolalaridan tashkil topgan. Olingan namunada paxta tolasining miqdori ko'pligi sababli matoning IQ spektrida syellyulozaga xos bo'lgan yutilishlarni ko'rish mumkin [7]. Bular 3279.37  $\text{sm}^{-1}$  sohada -OH bog'iga, 1155.78  $\text{sm}^{-1}$  sohada piranoza halqasiga tegishli, 1016.28  $\text{sm}^{-1}$  sohada S-O-S ko'prigiga tegishli bo'lgan yutilishlarning yaqqol namoyon bo'lganini ko'rish mumkin. Bu natijalar adabiyot ma'lumotlariga mos keladi. Jun gazlamasining olingan namunasining IQ spektrida oqsillarga xos bo'lgan yutilishlarni ko'rish mumkin [8].

Bular 3291.86  $\text{sm}^{-1}$  sohada - N-H bog'iga, 2891.36  $\text{sm}^{-1}$  sohada  $\text{SN}_2$ , 1712.12  $\text{sm}^{-1}$  S=O bog'iga, 1240.65  $\text{sm}^{-1}$  sohada SNH, 1093.27  $\text{sm}^{-1}$  1016.47  $\text{sm}^{-1}$  cohada C-O-S ga tegishli bo'lgan yutilishlarning yaqqol namoyon bo'lganlini ko'rish mumkin. Bu natijalar adabiyot ma'lumotlariga mos keladi. Ipak fibroinini infraqizil spektroskopiya usuli bilan tadqiq qilish natijasida 1660, 1540, 1235 va 650  $\text{sm}^{-1}$  da yutilish chiziqlari ko'rinishi mos ravishda 1-amid, 2-amid, 3-amid va 4-amid bog'lariga to'g'ri keladi. Tasodifiy o'ram konformasiyasining xarakteristikasi (amorf) va 1630, 1535, 1265 va 700  $\text{sm}^{-1}$ da paydo bo'ladigan yutilishlar p-konformasiya (kristall) ko'rsatadi [9].

### XULOSA

Har xil turdag'i ipaklarning IQ spektrlaridagi 1400–800  $\text{sm}^{-1}$  oralig'idagi yutilishini tahlil qilinsa 1015  $\text{sm}^{-1}$  dagi Gli -Gli, 970  $\text{sm}^{-1}$  dagi Ala-Ala hamda 998 va 975  $\text{sm}^{-1}$  dagi yutilishlar Ala-Gli bog'lanishlari uchun belgilanadi. Shuningdek, IQ spektri deformatsion tebranishlari -OH va C-O-C guruhining valent tebranishlari ko'rindi. Adabiyotlarga solishtirildi va taxlil qilindi.

### ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xaitbaev A.X., Maulyanov S.A., Toshov X.S., Organik birikmalarni UB- va IQ-spektr usullari èrdamida tahlil qilinsa 1015  $\text{sm}^{-1}$  dagi Gli -Gli, 970  $\text{sm}^{-1}$  dagi Ala-Ala hamda 998 va 975  $\text{sm}^{-1}$  dagi yutilishlar Ala-Gli bog'lanishlari uchun belgilanadi. Shuningdek, IQ spektri deformatsion tebranishlari -OH va C-O-C guruhining valent tebranishlari ko'rindi. Adabiyotlarga solishtirildi va taxlil qilindi.
2. Eshimbetov AG, IQ-spektroskopiya usulidan amaliy qo'llanma. Toshkent-2014.
3. Задачи на комплексное применение физико-химических методов для выяснения структур соединений можно найти в кн.: Козицына Л. А.Куплетская Н. Б. Применение УФ-, ИК-, ЯМР- и масс-спектроскопии в органической химии. -М.: Изд-во МГУ, 1979.
4. Лундин А. Г., Федин Э.И. ЯМР-спектроскопия. -М.: Наука, 1986.-224 с.
5. Zhalolov I.Zh., Khujaev V.U., Levkovich M.G. Aripova S.F., and. Shashkov A.S.. Alkaloids of Arundo donax L. XI. NMR spectroscopic study of the structure of the dimeric alkaloid arundamine // Chemistry of Natural Compounds - 2002. -Vo1.38. -№3. -P. 276-279.
6. Ибрагимов, А. А., Амирова, Т. Ш., & Иброхимов, А. А. (2021). Химический состав маргиланского шёлка. *Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft*, (14), 12-15.
7. Амирова, Т. Ш. (2022, June). Химический состав шелковых и шерстяных тканей. In *Conference Zone* (pp. 79-80).
8. Amirova, T., Ibragimov, A., & Nazarov, O. (2021). Coloring Natural Silk with Natural Dyes Obtained from Plants. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7089-7093.
9. Vidal, B.de C., Mello, M. L. Collagen type I amide I band infrared spectroscopy. *Micron*. 2011. 42(3). pp. 283–289. <https://doi.org/10.1016/j.micron.2010.09.010>